

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**

ACCIDENTE OFIDICO

Estudio Retrospectivo, Clínico, Antropológico y
Epidemiológico, realizado en el Departamento
de Jutiapa, Del 1o. de Enero de 1987 al 31
de Diciembre de 1992. Guatemala.

T E S I S

Presentada a la Honorable Junta Directiva de la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.

P O R

LUIS ARNOLDO YAN SANCHEZ

En el acto de su investidura de:

MEDICO Y CIRUJANO

GUATEMALA, ABRIL DE 1994.



FORMA C

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
GUATEMALA, CENTRO AMERICA

Guatemala, 8 de abril
DIF/1115-94

de 199 4

Director Unidad de Tesis
Centro de Investigaciones de las Ciencias
de la Salud - Unidad de Tesis

Se informa que el: Pachiller LUIS ARNOLEDO
Título o diploma de diversificado, Nombres y apellidos

YAN SANCHEZ Carnet No. 8716197
completos

Ha presentado el Informe Final del trabajo de tesis titulado:

ACCIDENTE OFIDICO. Estudio Retrospectivo, Clínico, Antropológico y epidemiológico

realizado en el Departamento de Jutiapa, Del lo. de Enero de 1987 al 31 de Diciembre de 1992. Guatemala.
y cuyo autor, asesor(es) y revisor nos responsabilizamos de los conceptos metodología, confiabilidad y validez de los resultados, pertinencia de las conclusiones y recomendaciones, así como la calidad técnica y científica del mismo, por lo que firmamos conformes:



Asesor
Firma y sello personal

Dr. Carlos Escobedo Pacheco
Colegiado No. 1472

Firma del estudiante

Revisor
Firma y sello
Registro Personal 9,912.-

Edgar Andrés de León Barillas
MEDICO Y CIRUJANO
COLEGIADO 4040

DL
OS
T(71441)

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FORMA D

H A C E C O N S T A R Q U E :

El Bachiller: LUIS ARNOLDO YAN SANCHEZ

Carnet Universitario No. 87-16197

Previo a optar al Título de Médico y Cirujano, en su Examen General Público ha presentado el Informe Final del trabajo de tesis titulado: "ACCIDENTE OFIDICO" Estudio retrospectivo, clínico, entomológico y epidemiológico realizado en el Departamento de Jutiapa, del 1.º de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1992, Guatemala.

Avalado por asesor(es) y revisor, por lo que se emite la presente **ORDEN DE IMPRESION:**


Guatemala, 8 de abril de 1994

Dr. Edgar R. De León Barillas
Por Unidad de Tesis

Dr. Raúl A. Castillo Rodas
Director del Centro de Investigaciones
de las Ciencias de la Salud

I M P R I M A S E :

Dr. Jafeth Ernesto Cabrera Franco
N O



INDICE

	Página
I. INTRODUCCION	1
II. DEFINICION DEL PROBLEMA	2
III. JUSTIFICACION	3
IV. OBJETIVOS	4
V. REVISION BIBLIOGRAFICA	5
VI. METODOLOGIA	60
VII. PRESENTACION DE RESULTADOS	66
VIII. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS	92
IX. CONCLUSIONES	95
X. RECOMENDACIONES	96
XI. RESUMEN	97
XII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	98
XIII. ANEXOS	100

I.- INTRODUCCION

La mordedura por serpiente, no es un accidente común, pero si es de los casos que deben ser tratados inmediatamente, por la gravedad y complicaciones que puede ocasionar, incluso la muerte del afectado. Sólo en Sudamérica ocurren de 3,000 a 4,000 muertes por año.

Guatemala, a pesar de ser un país en donde la agricultura ocupa un lugar preponderante y en el cuál la mayoría de la población todavía habita en el área rural, no cuenta con información estadística confiable, ni una forma apropiada para registrar los casos de accidente ofídico. Es más, no cuenta con un protocolo estandarizado de tratamiento adecuado para accidentes con nuestra herpetofauna.

Debido a lo anterior, fue necesario realizar un estudio retrospectivo-descriptivo sobre accidente ofídico en el Departamento de Jutiapa, del 1 de Enero de 1987 al 31 de Diciembre de 1992, para conocer que grupo etáreo, profesión, y sexo, fueron los más afectados, así como también la variedad de ofidio más frecuentemente involucrada en estos casos.

Los hallazgos más sobresalientes fueron, que el rango de edades más afectados es entre los 10 a los 39 años con un 61.29% de casos, siendo más afectado el sexo masculino con 71%. La ocupación más aquejada fue la de agricultor con 32.26%.

La serpiente más comúnmente involucrada en el accidente ofídico fue la *Crotalus Durissus* con 16.1%, es de hacer notar que el 75.8% de los afectados desconocían la variedad de serpiente que los atacó.

Las limitaciones que se observaron para la recolección de estos datos fue la falta de buenos sistemas de registro en los centros de salud u hospitales consultados o el deterioro de los ya existentes. Aunado a lo anterior, el personal que se relaciona con las historias clínicas, no utilizan el método de Weed, lo que hace aún más difícil la recolección de los datos.

La población consultada que se dedica a la etnomedicina sobre mordedura de serpiente, dio información valiosa y variada al presente estudio.

II.- DEFINICION DEL PROBLEMA

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año ocurren unas 300,000 mordeduras de serpientes en el mundo, que producen a su vez 30,000 a 40,000 muertes aproximadamente; el mayor número de la cuales ocurren en Birmania y Brasil.¹⁵

Estos accidentes son derivados de una provocación, que en algunos casos no es física, pues el animal se siente amenazado y ataca, ya que normalmente acomete sólo a aquellos seres que son su presa.²⁰

Guatemala, es un país eminentemente agrícola y con herpetofauna variada, situación que repercute en el aumento del riesgo de la población al accidente ofídico.

Lamentablemente a este problema no se le ha dado la importancia para minimizarlo, tanto es así que, en nuestro país no contamos con fuentes de información confiables, además de que el conocimiento del personal médico, para-médico como el de la población en general es deficiente en éste aspecto.¹⁷

Por otra parte, los servicios de salud no cuentan con los recursos necesarios para atender a la población que consulta por este problema, careciendo de sueros antiofídicos ya que estos son de alto costo, difíciles de conseguir y cuando se obtienen no son específicos para las especies de nuestro país, ya que son de origen extranjero y por lo general están vencidos.²²

Además muchos de los pacientes que son mordidos por serpientes, no acuden a los servicios de salud y consultan con personas que practican la etnomedicina, de quienes desconocemos el tipo de tratamiento que ofrecen, su efectividad y las consecuencias de los mismos.

III.- JUSTIFICACION

El temor a las serpientes venenosas es muy antiguo, pero el conocimiento de las enfermedades que producen es muy limitado.¹⁵

En un país como el nuestro, en el cual, la agricultura es el principal medio de producción y la mayoría de la población aún radica el área rural, el ofidismo es un problema real al cual, no se la ha prestado la debida atención, ya que representa grandes pérdidas tanto humanas, como en recursos económicos, pues el tratamiento de personas que han sufrido de mordeduras de serpiente tiene un alto costo, tanto en medicamentos como en días de estancia hospitalaria.¹⁵

No obstante lo anteriormente expuesto, la morbilidad y mortalidad del accidente ofídico en Guatemala, es difícil de cuantificar pues no se cuenta con datos estadísticos confiables que revelen la verdadera magnitud del problema.

Es más, no existen datos acerca del área de mayor frecuencia de pacientes fallecidos o limitados físicos por accidente ofídico. Aunado a lo anterior, se desconoce el tratamiento utilizado por la población indígena y campesina para estos casos, su efectividad y la conveniencia del mismo.²²

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario realizar un estudio a nivel nacional para tener una panorámica real del problema, de forma que se puedan tomar conductas que tiendan a mejorar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de estos pacientes.

IV.- OBJETIVOS

A.- GENERAL:

- 1.- Efectuar un estudio antropológico, clínico y epidemiológico sobre accidente ofídico en el Departamento de Jutiapa.

A.- ESPECIFICOS:

- 1.- Determinar la morbi-mortalidad por accidente ofídico en los últimos seis años en el Departamento de Jutiapa.
- 2.- Analizar la evolución del accidente ofídico en los servicios de salud.
- 3.- Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas de la población de Jutiapa sobre el tratamiento del accidente ofídico.
- 4.- Identificar las distintas especies de ofidio y sus respectivas denominaciones en cada región del Departamento de Jutiapa.
- 5.- Realizar un protocolo de manejo sobre accidente ofídico.

V.- REVISION BIBLIOGRAFICA

A.- MONOGRAFIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

Jutiapa fue creado por acuerdo gubernativo del 8 de mayo de 1,852.

Etimológicamente Jutiapa significa "en el río de los Jutes" ó "Río de las flores".

Jutiapa es uno de los 22 departamentos de los que conforman a la República de Guatemala, encontrándose en la región Sur-Oriental del país. con una extensión de 3,219 km². y con una población de 251,642 hab. según el censo nacional de 1,981.

El departamento esta formado por 17 municipios, teniendo en su extremo Sur Poniente una punta costera, un litoral, en el municipio de Moyuta. En el lugar denominado El Salamar, y en su longitud, desde el esquinero Sur-Poniente hasta el esquinero Sur-Oriente, toca la frontera con la República de El Salvador; su territorio es irregular, alargado en sus extremos Nor-Oriente y Sur-Poniente; colinda al Norte con Jalapa; al Sur con El Salvador y el Océano Pacífico; al Oriente con Chiquimula y al Poniente con Santa Rosa.

La altura de la cabecera departamental, la ciudad de Jutiapa, es de 906 msnm., con un clima tipo caluroso que se dá en casi todo el departamento, siendo frío en los meses de noviembre, diciembre y enero.

Latitud 14 gr., 17'42" Longitud 89gr., 53'41"

Posee variedad de ríos; de los cuales muchos se secan en verano ya que los utilizan para regadíos de cultivos, tambien posee variedad de lagos, lagunas, lagunetas entre las que se pueden mencionar la de Guija, (la que es de difícil acceso), las lagunas de Atescatempa, El Comendador, la de Retana (las que secan parte para cultivar en verano). También hay variedad de volcanes y varios lugares turísticos mucho de lo cual es herencia Pipil la cual se desarrollo en esa región.

En su parte norte Jutiapa es un lugar árido, semidesértico, seco, caluroso, pedregoso con poca vegetación, pero que la población gracias a su esfuerzo ha logrado hacer rendir, siendo sus principales cultivos maíz, frijol, maicillo, tomate, cebolla, chile, café, sandía, melón, papaya y otros. Se dedica también a la ganadería, donde ha obtenido múltiples honores y reconocimientos a nivel nacional e internacional; siendo los principales el ganado vacuno, porcino, mular y caballar. También sobresale la industria lechera, la tenería, la pesca, el comercio y otras. La parte sur es de tierra más generosa y de tipo costa.

En lo que respecta a su población la mayoría es ladina o descendiente de españoles y el idioma principal hablado es el castellano, existiendo pequeños

vestigios de la lengua pipil.

Por su complejión física varían así:

En los municipios de Jutiapa, Yupiltepeque, Jeréz, Comapa y Zapotitlán hombres, de color moreno, fuertes y altos.

En San José Acatempa, Quezada, El Progreso, Asunción Mita, Agua Blanca, Atescatempa y Santa Catarina Mita; gente blanca, y hasta rubia, robustos y barbados.

En Pasaco y Moyuta en donde es un tipo especial de gente, de porte elegante y distinguido. Los demás restantes municipios no tienen uno definido.

El departamento está unido al resto del país a través de varias carreteras y caminos asfaltados y de terracería; siendo las principales la Interamericana que va desde Los Esclavos, Santa Rosa hasta San Cristobal, Frontera. la que va desde Oratorio hasta Valle Nuevo, Jalpatagua (frontera), la que va desde Chiquimulilla hasta Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta (frontera), las otras que van desde Jalpatagua a Moyuta y que unira hasta la Ciudad Pedro de Alvarado, otra que va desde El Progreso a Monjas, otra que va desde Asunción Mita a Ipala pasando por Santa Catarina Mita y Agua Blanca (en construcción.). Hay también otras vías de acceso tales como caminos reales, veredas, etc. En lo que se refiere a los sistemas de Salud de Jutiapa, cuenta con 1 Hospital, 2 centros de salud tipo "A", 9 centros de Salud tipo "B" y con 47 puestos de salud donde, en 16, se contaba con Médicos EPS de la Facultad de Medicina de la USAC.

Hay también servicios privados de salud entre los que se puede mencionar: médicos, curanderos, sanatorios, servicios de organizaciones no gubernamentales. (1 Hospital Infantil en El Progreso).

La feria titular Departamental, que es dedicada a la ganadería, es celebrada del 10 al 16 de noviembre.

TABLA DE CARRETERAS Y DISTANCIAS.

De Guatemala	a	Jutiapa	119 kms.
De Jutiapa	a	El Progreso	12 kms.
De Jutiapa	a	Santa Catarina Mita	28 kms.
De Jutiapa	a	Atescatempa	42 kms.
De Jutiapa	a	Asunción Mita	32 kms.
De Jutiapa	a	Jeréz	40 kms.
De Jutiapa	a	Yupiltepeque	18 kms.
De Jutiapa	a	Jalpatagua	32 kms.
De Jutiapa	a	Conguaco	48 kms.
De Jutiapa	a	Moyuta	56 kms.
De Jutiapa	a	San José Acatempa	30 kms.
De Jutiapa	a	Agua Blanca	40 kms.
De Jutiapa	a	Quezada	20 kms.
De Jutiapa	a	Comapa	50 kms.
De Jutiapa	a	Zapotitlán	41 kms.
De Jutiapa	a	Pasaco	86 kms.

MONOGRAFIA DE CADA MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

Municipio de Jutiapa.

Limita al norte con Jalapa y los municipios de El Progreso y Santa Catarina Mita; al oriente con Asunción Mita; al sur con los municipios de Comapa, Yupiltepeque y El Adelanto; al occidente con Quezada y Jalpatagua.

Altitud de la cabecera 906 msnm.

Latitud 14 gr., 17'49" Longitud 89gr., 53'41"

Extensión 620 km². Pob. 60,149 habs.

Fiesta Titular; 22 al 24 de julio.

cuenta con 1 ciudad 26 aldeas 140 caseríos.

Municipio de Agua Blanca.

Limita al norte con Ipala y Concepción las Minas; al sur con El Salvador; al occidente con Asunción Mita, Santa Catarina Mita y San Juan Chaparrón.

Altitud 897 msnm. Latitud 14 gr., 29'43"

Longitud 89gr., 38'56" Extensión 340 kms².

Población 12,075 habs.

Feria titular del 4 al 8 de enero dedicada a los Santos Reyes. Días de mercado jueves y domingos.

cuenta con 1 pueblo, 14 aldeas y 85 caseríos.

M u n i c i p i o d e A s u n c i ó n M i t a .

Limita al norte con Santa Catarina Mita y Agua Blanca; al sur con Atescatempa, Yupiltepeque, y la República de El Salvador; al oriente con Agua Blanca y El Salvador; al occidente con Jutiapa y Yupiltepeque.

Antiguo recinto y señorío del Rey Mictlan jefe y cacique de esa región.

Altitud 470 msnm., Área 476 kms². pobl. 30,360habs.
 Lugares turísticos: Lago de Guija, balnearios de Ayucinapa, Mongoy y el Río Ostúa.
 Transporte: cada 30 minutos hasta las 16 pm.
 Hospedajes: hay varios.
 Fiesta titular: 12 al 15 de agosto y 6 al 12 de diciembre.
 cuenta con 1 villa, 36 aldeas y 71 caseríos.
 días de mercado jueves y domingos.
 Actividad: Agricultura, Ganadería, Comercio, talabartería y otras actividades de servicio.

Municipio de Atescatempa.

Limita al norte con Asunción Mita; al sur con El Salvador; al Oriente con EL Salvador; al occidente con Jerez y Yupiltepeque.
 Etimologicamente: "a la orilla de la laguna".
 Latitud 14gr.,10'34", Longitud 89gr.,44'33"
 Altitud 700 msnm. área 68 kms². pob. 11,780 habs.
 Fiesta titular: dedicada a San Nicolás, del 3 al 5 de noviembre.
 Actividad: Agricultura, Ganadería, comercio y pesca.
 Transporte: es escaso y Hospedajes no hay.
 turismo: la laguna de Atescatempa y San Cristobal Frontera.
 Cuenta con 1 pueblo, 9 aldeas y 13 caseríos.

Municipio de Comapa.

Limita al norte con Jutiapa; al oriente con El Adelanto y Zapotitlán; al occidente con Jalpatagua; al sur con Jalpatagua y El Salvador.
 Etimología: "Lugar de la olla de agua".
 Latitud 14gr.,06'41", Longitud 89gr.,44'59".
 Altitud 1,250 msnm. área 132 kms². pob.13,898 habs.
 Fiesta Titular: 14 al 18 de diciembre y 17 -20 agosto.
 Actividad: Agricultura y Alfarería.
 Transporte es escaso, la última camioneta sale a las 7 a.m. hospedajes no hay.
 Sitios arqueológicos: Las Pilas y Comapa.
 Cuenta con 1 pueblo 9 aldeas 33 caseríos.

Municipio de El Progreso.

Limita al norte con Monjas y Santa Catarina Mita; al sur con Jutiapa; al oriente y occidente con Jutiapa.
 Latitud 14 gr.,21'13" Longitud 89gr.,50'56".
 Altitud 969 msnm. Área 68 kms². pobl. 20,168 habs.
 fiesta del lugar: 11 de febrero. días de mercado jueves y domingos. Transporte: cada 20 a 30 minutos.
 Hospedajes: hay varios.

Actividad: Comercio, agricultura, ganadería y otros servicios.
Cuenta con 1 pueblo, 7 aldeas y 13 caseríos.

Municipio de Jalpatagua.

Limita al norte con San José Acatempa y Quezada; al sur con Conguaco, Moyuta y El Salvador; al oriente con Jutiapa, Comapa y El Salvador; al occidente con Oratorio y Moyuta.

Etimológicamente: "Río Ancho".

Latitud 14 gr., 03' 18" Longitud 90gr., 00' 30"

Altitud 557 msnm. Área 204 kms². pob. 13,672 habs.

Fiesta Titular: 21 de diciembre.

Turismo: Balneario "Andá y Mirá", Valle Nuevo. (frontera).

Transporte: Cada hora. Hospedajes hay varios.

Actividad: Agricultura y ganadería.

cuenta con 1 pueblo, 13 aldeas y 17 caseríos.

Municipio de Conguaco.

Limita al norte con Jalpatagua; al Sur con El Salvador; al oriente con Jalpatagua y El Salvador; a; occidente con Moyuta.

Latitud 14gr., 02' 48" Longitud 90gr., 02' 00"

Altitud 1,100 msnm. Área 128 kms². pobl. 10,339 habs.

fiesta del lugar; 17 al 19 de diciembre.

Transporte: es escaso y hospedajes no hay.

Actividad: agricultura y ganadería.

Cuenta con 1 pueblo, 6 aldeas, 29 caseríos.

Municipio de El Adelanto.

Limita al norte con Jutiapa y Yupiltepeque; al sur con Zapotitlán y Comapa; al oriente con Yupiltepeque y Zapotitlán; al occidente con Comapa y Jutiapa.

Latitud 14 gr., 10' 08" Longitud 89gr., 49' 49"

Altitud 1,100 msnm. Área 31 kms². pob. 4,273 habs.

fiesta titular: 17 al 19 de marzo.

Transporte es escaso. Hospedajes no hay.

Actividad: agricultura y ganadería.

cuenta con 1 pueblo, 4 aldeas, 4 caseríos.

Municipio de Jeréz.

Limita al norte con Yupiltepeque y Atescatempa; al sur con El Salvador; al oriente con El Salvador; y al Occidente con Zapotitlán.

Latitud 14 gr., 05' 24" Longitud 89gr., 45' 05"

Altitud 700 msnm. Área 60 kms². Pob. 4,274 habs.

Antes se le llamaba Chingo; se le cambió el nombre a travez del acuerdo gubernativo del 5 de octubre de 1892.

fiesta titular. 5 de marzo.

Actividad: Agricultura y ganadería.
Cuenta con 1 pueblo, 2 aldeas, 5 caseríos.

Municipio de Moyuta.

Limita al norte con Oratorio y Tecuaco; al sur El Salvador y el Océano Pacífico; al oriente con Jalpatagua y Conguaco; al occidente con Pasaco.
Etimológicamente: "lugar donde abundan los mosquitos"
Latitud 14 gr., 2' 18" Longitud 90 gr., 04' 54"
Altitud 1,283 msnm. Área 380 kms². pobl. 22,812 hab.
Actividad: Agricultura, comercio, ganadería, pesca y otros servicios.
Transporte: cada 2-3 horas hasta las 15 hrs. p.m.
hospedajes; escaso.
cuenta con 1 pueblo, 38 aldeas, 32 caseríos.

Municipio de Pasaco.

Limita al norte con Tecuaco, Chiquimulilla y Oratorio; al sur con el Océano Pacífico; al oriente con Moyuta; al Occidente con Chiquimulilla.
Latitud 13gr., 58' 46" Longitud 90 gr., 12' 26".
Altitud 150 msnm. Área 308 kms². pobl. 5,605 hab.
Fiesta titular: 1er. viernes de cuaresma.
Sitios Arqueológicos. Potrerillos, La Nueva y Pasaco.
Actividad: Fabricación de atarrayas, trasmayos, tejas y ladrillos.
Hospedaje y transporte: son escasos.
cuenta con 1 pueblo. 4 aldeas. 17 caseríos.

Municipio de Quezada.

Limita al norte con Jutiapa y Casillas; al sur Jalpatagua y Jutiapa; al oriente con Jutiapa; al occidente San José Acatempa, Jalpatagua y Cuilapa.
Latitud 14 gr., 16' 12" Longitud 90gr., 02' 12".
Altitud 980 msnm. Área 84 kms². pob. 11,355 hab.
creado por acuerdo gubernativo del 18 de junio de 1897.
Actividad: Agricultura y ganadería.
Transporte: el pueblo se encuentra a 2 kms de la ruta Interamericana, donde pasan las camionetas cada 20 minutos hasta las 17 p.m.
Hospedaje: no hay.
Fiesta del lugar es del 27 al 30 de noviembre.
cuenta con 1 pueblo, 13 aldeas y 12 caseríos.

Municipio de Santa Catarina Mita.

Limita al norte con San Manuel Chaparrón; al sur con Asunción Mita, Jutiapa y El Progreso; al oriente con Agua Blanca; al occidente con El Progreso y Monjas.
Latitud 14gr., 27' 02", Longitud 89gr., 44' 39".
Altitud 700msnm. Área 132 kms². pob. 16,415 hab.
fiesta del lugar es del 21 al 25 de noviembre.

Actividad: Agricultura, tenería y alfarería.
 Transporte: hay cada 2-3 horas, la última camioneta sale a las 14.00 p.m. Hospedaje. escaso.
 cuenta con 1 pueblo. 19 aldeas 35 caseríos.

Municipio de San José Acatempa.

Limita al norte con Casillas y Quezada; al sur con Jalpatagua y Oratorio; al Oriente con Quezada y al occidente con Oratorio y Cuilapa.

Latitud 14 gr., 15' 42" Longitud 90gr., 07' 36"

Altitud 1,325 msnm. área 68 kms². pob. 7,859 hab.

Antes Azacualpa, fue creado por acuerdo gubernativo del 22 de marzo de 1934.

Actividad: Agricultura y ganadería.

Transporte: está a 500 mts de la carretera Interamericana, donde pasan las camionetas a cada 20-30 minutos hasta las 17.00 p.m. hospedajes. no hay.

feria del lugar 3 al 6 de febrero.

cuenta con 1 pueblo, 11 aldeas y 7 caseríos.

Municipio de Yupiltepeque.

Limita al norte con Jutiapa y Asunción Mita; al sur con Jeréz; al oriente con Atescatempa; al occidente con El Adelanto y Zapotitlán.

Etimológicamente: "En el cerro del dios Totec"

Latitud 14gr., 11' 44", Longitud 89gr., 47' 33"

Altitud 1,050 msnm. área 36 kms². pob. 8,484 hab.

Actividad: Agricultura, fabricación de jarcia y tenería.

feria del lugar: 16 al 20 de octubre.

cuenta con 1 pueblo 10 aldeas y 7 caseríos.

Hospedajes no hay; transporte limitado.

Municipio de Zapotitlán.

Limita al norte con El Adelanto y Yupiltepeque; al sur con El Salvador; al oriente Jeréz; al occidente con Comapa y El Adelanto.

Etimológicamente: "Lugar de los palos de zapote"

Latitud 14gr., 08' 15" Longitud 89gr., 49' 35"

Altitud 900 msnm. área 84 kms². pob. 5,703 hab.

feria del lugar 15 al 18 de febrero.; dedicada a San Miguel Arcangel. Días de mercado jueves y domingo.

Actividad: Agricultura, Ganadería y alfarería.

cuenta con 1 pueblo, 7 aldeas y 24 caseríos.

Hospedaje y transportes: escaso.

NOMBRE Y NUMERO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA DE SALUD DE JUTIAPA.

- 1.- Jefatura de Area de Salud.
Distrito de Agua Blanca.
- 2.- Centro de Salud de Agua Blanca.
- 3.- P.S. aldea Las Cañas.
- 4.- p.s. aldea El Tempisque.
- 5.- p.s. aldea El Obrajuelo.
- 6.- p.s. aldea La Cima.
- 7.- p.s. aldea Santa Gertrudis.
Distrito de Salud de Asunción Mita..
- 8.- Centro de Salud y anexa de Maternidad Asunción Mita.
- 9.- p.s. aldea Anguiatu.
- 10.- p.s. aldea Asunción Grande.
- 11.- p.s. aldea Cerro Blanco.
- 12.- p.s. aldea Estanzuela.
- 13.- p.s. aldea Tamarindo.
- 14.- p.s. aldea San Joaquín.
Distrito de Salud de Atescatempa
- 15.- Centro de Salud y Maternidad anexa de Atescatempa.
- 16.- puesto de salud de El Adelanto.
- 17.- puesto de salud Contepeque.
- 18.- puesto de salud Horcones.
- 19.- puesto de salud Esmeralda.
- 20.- puesto de salud Jeréz.
- 21.- puesto de salud El Jícaro.
- 22.- puesto de salud de San Antonio Papaturro.
- 23.- puesto de salud de San Cristobal Frontera.
- 24.- puesto de salud de Yupiltepeque.
- 25.- puesto de salud de Zapotitlán.
Distrito de Salud de Comapa
- 26.- Centro de Salud de Comapa.

- Distrito de Salud de El Progreso.
- 27.- Centro de Salud de EL Progreso.
- 28.- puesto de salud la Acequia.
- 30.- puesto de salud El Ovejero.
Distrito de Salud de Jalpatagua.
- 31.- Centro de Salud de Jalpatagua.
- 32.- puesto de salud de Azulco.
- 33.- puesto de salud de San Ixtán.
- 34.- puesto de salud de Valle Nuevo.
Distrito de Salud De Jutiapa.
- 35.- Centro de Salud de Jutiapa.
- 36.- puesto de salud de El Amayito.
- 37.- puesto de salud de Animas Lomas.
- 38.- puesto de salud de Cañas.
- 39.- puesto de salud de Lagunillas.
- 40.- puesto de salud de El Matilisquate.

- 41.- puesto de salud de Potrero Grande.
- 42.- puesto de salud de Valencia.

Distrito de Salud de Moyuta.

- 43.- Centro de Salud de Moyuta.
- 44.- puesto de salud de Bethania.
- 44.- puesto de salud de Conguaco.
- 45.- puesto de salud de Garita Chapina.
- 46.- puesto de salud del Parcelamineto Montufar.
- 47.- puesto de salud de El Paraiso.
- 48.- Puesto de salud de Pasaco.
- 49.- puesto de salud de Ciudad Pedro de Alvarado.
- 50.- puesto de salud de San Pedro Conguaco.
- 51.- puesto de salud de el Salamar.

Distrito de Salud de Santa Catarina Mita.

- 52.- Centro de Salud de Santa Catarina Mita.
- 53.- puesto de salud de Aldea Nueva.
- 54.- puesto de salud Jocote Dulce.
- 55.- puesto de salud La Barranca.
- 56.- puesto de salud de Horcones.

Distrito de Salud de San José Acatempa.

- 57.- Centro de Salud de San José Acatempa.

Distrito de Salud de Quezada.

- 58.- Centro de Salud de Quezada
- 59.- puesto de salud de Santa Gertrudis.
- 60.- HOSPITAL NACIONAL DE JUTIAPA. "ERNESTINA VIUDA DE RECINOS".

VER ANEXO No. 3

B.- OFIDIOS

1.- Antecedentes:

El hombre tiene tendencia a ponerse en contacto con una gran variedad de animales venenosos, estos contactos ocurren con muchas especies zoológicas que comprenden víboras, saurios, animales marinos, arañas, alacranes, y muchas especies de insectos. En general resultan dos tipos de lesiones: las secundarias al efecto directo del veneno en la víctima como en mordeduras de víboras, y las debidas a efectos indirectos del veneno de las cuales son ejemplo reacciones de hipersensibilidad a picaduras de abejas. Esto tiene gran significación en salud pública debido a la pérdida en productividad económica y potencial humano que resulta de los muchos envenenamientos graves, no mortales, que anualmente ocurren en niños y adultos que trabajan, por otra parte sanos.²¹

En Guatemala los trabajos sobre ofidios son muy pocos, algunos trabajos que se realizaron fueron por Van Den Brule investigador del ofidismo en nuestro país, la mayoría de sus investigaciones inéditas, y otras con la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.²²

Se calcula que en nuestro país un 30 a 35% de las serpientes son venenosas, y siendo un país tropical donde la mayoría de sus habitantes trabajan en labores agrícolas, esto dá lugar a que ocurran accidentes ofídicos, lastimosamente no contamos con estadísticas a nivel nacional sobre la morbilidad y mortalidad del accidente ofídico en Guatemala.²³

2.- Clasificación:

Las serpientes están clasificadas en cinco grandes familias que son:^{2,3,7,7}

- 1) Hydrophidae (serpiente de mar). En Guatemala solo existe un representante, Pelamis Platurus, que se localiza únicamente en el Océano Pacífico.
- 2) Boidae (serpientes constrictoras). En nuestro país existe solo la Boa Constrictor Imperatus (Mazacuata).
- 3) Elapidae (serpientes corales). Se encuentran en Guatemala siete especies venenosas del género

Micruridae. (M. Browni, M. Diastema, M. Hippocrepis, M. Latifasciatus, M. Nigrocinctus, M. Stuarti).

4) Colubridae, la mayoría de serpientes no venenosas. Existen en nuestro país aproximadamente 100 especies.

5) Viperidae. La mayoría de serpientes venenosas. En nuestro país se cuenta con un representante del género Crotalidae (C. Durisus o cascabel). Uno del género Agkistrodon (A. Biliniatus o cantil de agua). Una del género Atropoides (A. Numifer o mano de piedra). Uno del género Bothrops (B. Asper o barba amarilla) una del género Cerrophidium, C. Godmani o sheta, cantil frijolillo, cantil de tierra fría. Dos del género Porthidium. P. Ophriomecas o vibora castellana, timbo. P. Nasutum o tamagás, chalpate, timbo. Cuatro del género Bothriechis. B. Marchi o tamagás pacayera, tamagás verde, tamagás de montaña. B. Ricolor o gushnayera, vibora verde. B. Aurifer o gushnayera, vibora de árbol. B. Schlegelii o vibora de pestañas, chajbole, vibora de árbol.

Por su aparato inoculador de veneno o por carecer de éste se clasifican en cuatro grupos que son: 1, 2, 3, 4.

1) Aglifas, tienen dientes pero carecen de glándulas venenosas y colmillos, todos los dientes son llenos (Colubridae y Boidae).

2) Opisthoglifas, con un sistema venenosos completo, un par de glándulas venenosas en la mandíbula superior y uno ó dos pares de colmillos con surcos localizados en la parte posterior del maxilar superior, de tal manera que puede inocular veneno cuando la presa pasa por los colmillos, cerca de la garganta del animal (Colubridae).

3) Proteroglifas, aparato venenoso completo cuya característica principal es tener un par de colmillos fijos con surcos posteriores localizado en parte anterior del maxilar superior, capacitados para inocular fácilmente veneno durante una mordedura. (Elapidae, Hydrophidae).

4) Solenoglifas, tienen el sistema más efectivo, formado por un par de glándulas venenosas laterales en conexión con colmillos muy desarrollados situados en la parte anterior del maxilar superior que es muy corto. Estos colmillos son horadados en su centro y en sentido longitudinal a semejanza de agujas hipodérmicas, tienen un sistema de articulación

complejo entre los huesos craneales en donde se encuentran múltiples inserciones de músculos que favorecen la erección de los colmillos hacia adelante cuando el animal muerde, cuando no es así, los colmillos se repliegan hacia atrás y están cubiertos por una mucosa. Las glándulas venenosas son comprimidas durante la mordedura por un complejo muscular especializado, pasando el veneno de la glándula al colmillo y de éste a lo profundo del área lesionada por la mordida. (Viperidae)?

3.- CLASIFICACION, DESCRIPCION Y
LOCALIZACION DE SERPIENTES VENENOSAS
DE GUATEMALA:

AGKISTRODDN BILINIATUS BILINIATUS (Gunther).
Cantil de Agua.


DESCRIPCION MORFOLOGICA: Vibora de cuerpo grueso, cola corta y moderadamente delgada. el color de fondo puede ser café-rojizo o grisáceo o gris oscuro, con una serie de bandas punteadas irregulares blancuzcas bordeadas generalmente de un color más intenso que el fondo. Pequeñas manchas o puntos blanquecinos están dispersos a lo largo del cuerpo.

La característica principal que la diferencia de las demás víboras, es el par de líneas blancuzcas o cremas presentes en cada lado de la cara, desde el rostro hasta la comisura de la boca y pasando por la región superciliar.

La parte distal de la cola es de color gris pálido o verde grisáceo y en los ejemplares jóvenes, verde esperanza o amarillento. La parte inferior del iris del ojo es café rojizo oscuro o castaño claro y la superior más pálida.

TAMAÑO: 1.40 metros de longitud, pero comúnmente es de 80 cms. a 1 metro.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Area del pacífico de 0 - 600 msnm. y en el río de Chichoy en el departamento de Alta Verapaz.



ATROPOIDES NUMMIFER (Ruppell).


Mano de Piedra, Brazo de Piedra, Chinchintor, Timbo, Xalpaté, Mococho, Otoy(a) y Cantil Sapo. (área del pacífico).

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Serpiente que difícilmente se confunde con las demás víboras, por su cuerpo corto y muy grueso, gran cabeza, cola muy corta y moderadamente delgada y escama fuertemente aquillada.

En la sub-especie Mexicanum (vertiente norte) el color del dorso y lateral es muy variado, presentando diferentes tonos de café, amarillentos o grisáceos, con quince a veinte manchones romboidales de color café oscuro o marrón, que se extienden hasta la cola. El dorso de la cabeza puede ser de café claro y/o oscuro con o sin manchas. Una franja gruesa y oscura post-ocular se extiende detrás del ojo hacia el ángulo de la mandíbula. El color del vientre puede ser claro e inmaculado o con innumerables manchas oscuras.

La sub-especie Occidum (zona del pacífico), presenta una coloración dorsal gris y café rosáceo, rojizo o morado y los manchones romboidales no están unidos como en la Mexicanum.

TAMAÑO: Comúnmente de 60 a 80 cms. de longitud (récord 1.25 mts)
la sub-especie Occidum es más pequeña.

A. nummifer**DISTRIBUCION GEOGRAFICA:**

A. Mexicanum: vertiente del caribe hasta el centro del departamento de Petén. 100 a 1600 msnm.

A. Occidum: vertiente del pacífico y en la Aldea Llano Grande en el depto. de Baja Verapaz. de 300 a 1600 msnm.

BOTHRIECHIS AURIFER (Salvin)
Gushnayera, Víbora del árbol.

DESCRIPCION MORFOLOGICA: serpiente de cuerpo moderadamente delgado. El dorso usualmente es verde uniforme con manchones amarillosbordesados de negro. Pocos ejemplares poseen una coloración uniforme sin diseños. El vientre es de color verde amarillento muy pálido. la parte distal de la cola prensil es verde-amarillento con diseños irregulares más oscuros, el iris es generalmente verde-amarillento ocasionalmente de color bronce con pequeñas manchas negras. Presenta franja post-ocular negra.

TAMARO: 80 a 100 cms. de longitud.

B. aurifer

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Sierra de los Cuchumatanes, Sierra de Chuacús y Sierra de Las Minas. 1200 a 2300 msnm.

BOTHRIECHIS BICOLOR (Bocourt)
Gushnayera-Víbora Verde.

DESCRIPCION MORFOLOGICA: Serpiente de cola prensil, cuerpo relativamente delgado y de coloración dorsal verde uniforme, con incrustaciones celestes entre escamas, principalmente en ejemplares jóvenes y subadultos. En este estadio el color verde esperanza es típico. El vientre es mucho más pálido que el dorso y completamente uniforme. El iris del ojo es verde-amarillento con pequeñas manchas negras.

TAMANO: aproximadamente 1 metro de longitud.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Cordillera volcánica del sur hasta el Volcán de Agua. 600 a 2000 msnm.



BOTHRIECHIS MARCHI (Barbour y Loveridge).
 Tamagás Pacayera, Tamagás Verde, Tamagás de Montaña.


DESCRIPCION MORFOLOGICA: Serpiente arbórea de cola prensil y cuerpo moderadamente delgado, con el color de fondo verde uniforme, verde-amarillento o verde-azulado. En algunos ejemplares la coloración de fondo se entremezcla con negro dando la impresión de un tejido. El vientre es amarillento o verde más claro que el color de fondo y uniforme. El iris del ojo es amarillo o verde-amarillento con manchas oscuras.

En los ejemplares jóvenes puede presentarse una coloración verde amarillenta o castaño con manchas

azules o café oscuro, con franja post-ocular, manchas paraventrales, el iris de color bronce y la punta de la cola verde oscuro o negra.

TAMAÑO: 80 a 100 cms. de longitud.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Hasta el momento sólo se ha localizado en el municipio de La Unión, Zacapa. A 1400 msnm. En julio de 1992 por German Ibarra.



BOTHRIECHIS SCHLEGELII (Berthold)
Chajbolay, Vibora del Arbol, Vibora de Pestañas.


DESCRIPCION MORFOLOGICA: Serpiente de cola prensil, cuerpo corto, moderadamente grueso y de coloración dorsal verde o verde oliva y/o grisáceo finamente bañado de negro, con innumerables manchas irregulares y jaspes rosados o de café claro u oscuro y salmón.

La parte ventral y paraventral del cuerpo es de color castaño claro, oscuro o rosado.

La característica principal que las distingue de las demás serpientes y de donde se origina su nombre vernacular (víbora de pestañas), son las 2 o 3 ESCAMAS SOBRE LOS OJOS (supraciliares).

TAMAÑO: 60 a 85 cms. de longitud.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Area del Caribe hasta el centro del departamento de Petén, de 0 a 1000 msnm.



BOTHRUPS ASPER (Garman)

Barba Amarilla, Devanador, Cantil Boca Dorada,
Ixbolay, Cantil
Cola de Hueso.

DESCRIPCION MORFOLOGICA: Es la víbora más grande del país, cuerpo moderadamente delgado y de coloración dorsal muy variado; predominando diferentes tonos de café y rosados (principalmente en los ejemplares jóvenes y subadultos) y con unos triángulos de líneas claras que se cruzan sobre el dorso formando un diseño en X. El color dentro de estos diseños (que varían de 18 a 25) es café oscuro aterciopelado. Por lo general el dorso de la cabeza no presenta ningún diseño. Los labios y la garganta son de color amarillento uniforme, algunas veces ligeramente pigmentado.

Debido a esta coloración proviene su nombre vulgar de BARBA AMARILLA. El vientre es blanquizco amarillento con pequeñas manchas pardas y grisáceas. En la parte dorsolateral las escamas presentan una serie de tonos grisáceos y pardos entremezclados y con manchas de café oscuro aterciopelado.

Debido a que los ejemplares jóvenes presentan una coloración dorsal más pálida que los adultos y por tener la parte distal de la cola de color blanquecino o amarillento proviene el nombre común de COLA DE HUESO.

TAMAÑO: Hasta 2.5 mts. de longitud, pero comúnmente de 1.2 a 1.8 mts. de largo.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Zona norte y sur del país.
de 0 a 1200 mts. snm.



CERROPHIDIUM GODMANI (Gunther)

Sheta, Cantil Frijolillo, Cantil de Tierra Fria.

DESCRIPCION MORFOLOGICA: Serpiente corta y moderadamente gruesa que presenta una coloración muy variada, que va de café claro, oscuro rojizo, grisáceo, verdoso o naranja, con manchones dorsales oscuros zigzagueantes, y con 20 a 33 manchas dorsolaterales. En la parte ventral el color se va oscureciendo progresivamente hasta volverse gris o negro. En la mayoría de los ejemplares presenta una pequeña mancha ovoide negra debajo del ojo, similar al del Cantil Sapo.

TAMARCO: 40 a 60 cms. hasta 75 cms.




DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Se encuentra desde las zonas occidentales de Huehuetenango, Quiché, hasta las montañas de Alta Verapaz, meseta central, Jutiapa. 1600 a 3200 msnm

PORTHIDIUM NASUTUM (Bocourt)
 Tamagás, Chalpate, Timbo.

DESCRIPCION MORFOLOGICA: Serpiente pequeña de cuerpo moderadamente grueso, con la coloración de fondo de diferentes tonos de café o gris, con 15 a 23 diseños rectangulares y triangulares oscuros alternados y opuestos a los lados de la columna y separados por una línea vertebral clara, especialmente en ejemplares jóvenes y subadultos. Escama rostral (hocico) ligeramente proyectada hacia arriba. Iris del ojo café oscuro y en los ejemplares jóvenes el color es más claro y encendido.

TAMANO: 60 cms. de largo.



DISTRIBUCION GEOGRAFICA:
 Area del Caribe hasta el centro del departamento de Petén. 0 a 900 msnm.

PORTHIDIUM OPHRYOMEGAS (Bocourt)

Timbo, Vibora Castellana.


DESCRIPCION MORFOLOGICA: Serpiente pequeña y ligeramente gruesa.

La coloración del dorso generalmente presenta diferentes tonos de gris o pardos con 24 a 40 diseños rectangulares unidos y opuestos entre si a lo largo de la columna y separados por una línea vertebral muy delgada de color ocre o anaranjada desde la nuca hasta la cola.

TAMAÑO: 40 a 70 cms. de largo.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Especialmente en las zonas áridas en el Valle del Motagua y en la zona sur de 0 a 350 msnm.

P. ophryomegas



CROTALUS DURISSUS (Linnaeus)

Víbora de Cascabel, Cascabel, Quiakxop, Sochaj.

DESCRIPCION MORFOLOGICA: Serpiente de cuerpo grueso y casi triangular. La coloración de fondo puede ser café grisácea, café rojizo, oliva amarillento o pajizo. Con 27 a 35 rombos oscuros marginados de tonos pálidos. Manchones oscuros entre los rombos se localizan en los costados. Las dos rayas oscuras longitudinales que se extienden en la nuca y el apéndice córneo articulado en que termina la cola, son las características principales de la especie.

TAMANO: 1.4 a 1.6 mts. de longitud (récord 1.8 mts.)



DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Principalmente en el oriente y sur del país, también en las sabanas del depto. de Petén. 0 a 1600 msnm.

FAMILIA: ELAPIDAE**GENERO: MICRURUS****Serpiente Coral, Coral, Coral Fino.**

Son serpientes ágiles y muy venenosas, que raramente exceden de un metro de longitud, poseen un sistema inoculador de veneno menos eficiente que el de los VIPERIDOS, y consiste en un par de colmillos erectos (Proteroglifos), situados en el frente de la mandíbula superior. El colmillo tiene un pliegue que lo recorre a lo largo a manera de surco. Los corales poseen colores muy llamativos, generalmente en secuencia de color amarillo-negro-amarillo-rojo-amarillo. En la cola por lo general poseen anillos negros y amarillos o cremas. La cabeza es pequeña, redondeada y con el hocico despuntado. Ojos negros y con la pupila subcircular.

Siete especies existen en nuestro país, con once razas o subespecies:


MICRURUS BROWNI.

DESCRIPCION MORFOLOGICA: Cuerpo moderadamente delgado color amarillo, negro, rojo. Anillos rojos: 11 a 29, con pequeñas incrustaciones negras.

TAMANO: Más de 60 cms.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Montañas del oeste del país y la cuenca de Antigua en el depto de Sacatepéquez. 900 a 1500 msnm.

M. browni



MICRURUS DIASTEMA.

DESCRIPCION MORFOLOGICA: Igual que el anterior, excepto por el número de anillos rojos. La subespecie Sapperi, no posee anillos amarillos en el cuerpo, solo en la cola.

TAMAÑO: Más de 85 cms.

M. diastema




DISTRIBUCION GEOGRAFICA:
Area norte y del Caribe.
de 0 a 1500 msnm.

MICRURUS ELEGANS.

DESCRIPCION MORFOLOGICA: 14 a 19 triadas de anillos
negros doble
banda amarillenta o blanca punteada y separados
por anillos naranjas.
TAMAÑO: Más de 100 cms.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Alta Verapaz. 1000 a 1830
msnm.



**MICRURUS
HIPPOCREPIS**

DESCRIPCION MORFOLOGICA: 15 a 26 bandas negras, algunas veces no están unidas. Punta de hocico amarilla.

TAMAÑO: Más de 65 cms.


DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Izabal y sur de Belice. 0 a 600 msnm.



MICRURUS LATIFASCIATUS.

DESCRIPCION MORFOLOGICA: 6 a 9 anillos negros y los rojos muy anchos, 2 ó 3 anillos negros en la cola.

TAMAÑO: Más de 100 cms.

M. latifasciatus


DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Zona del Pacífico, de 50 a 1000 msnm.

MICRURUS NIGROCINCTUS.

DESCRIPCION MORFOLOGICA: Con 10 a 29 anillos negros, la subespecie DIVARICATUS puede carecer totalmente de anillos amarillos en todo el cuerpo.

TAMANO: Más de 100 cms.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Zona Sur, Oriente Caribe, de 0 a 1300 msnm.

M. nigrocinctus

MICRURUS STUARTI.

DESCRIPCION MORFOLOGICA: Con 13 a 19 anillos negros en el cuerpo.

TAMANO: Más de 60 cms.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Zona Sur. De 600 a 1350 msnm.



GENERO: PELAMIS

PELAMIS PLATURUS: Serpiente de mar que habita en el Océano Pacífico. Posee una lista muy ancha en el dorso y la parte dorsolateral es amarillenta o castaño claro. La cola es aplanada en ambos lados con diseños irregulares negros. Cabeza fina y delgada.

TAMAÑO: Generalmente 75 cms, máximo reportado 113 cms.

P. platurus



4.- PATOGENIA

Los fenómenos patológicos que ocurren en los accidentes ofídicos son muchos, pero los más importantes son: efecto mionecrótico, hemorrágico, edema e inflamación, neurotóxico e involucramiento renal.^{2,22}

a) Efecto mionecrótico:

Uno de los componentes del efecto local es el desencadenamiento de necrosis de las fibras musculares que se inician en menos de una hora después del envenenamiento, esto por lisis de material intracelular, algunas fibras toman aspecto coagulativo; la necrosis más intensa se observa a las tres horas del accidente. Este efecto lo demuestra el veneno de: B. Asper y de C. Durissus.²

b) Efecto hemorrágico:

La hemorragia local y sistémica es uno de los efectos más consistentes y evidentes en el envenenamiento por B. Asper.

La hemorragia local aparece pocos minutos después del envenenamiento y adquiere su mayor intensidad seis horas después. La patogenia del efecto hemorrágico no está bien estudiado aún, pero algunos estudios sugieren que se deba a la acción de las toxinas hemorrágicas, que lesionan el endotelio capilar provocando extravasación, este sangrado es coadyuvado por el estado de anticoagulación. Se ha demostrado que las hemorrágicas provocan hemorragia por: a) afectación directa de la membrana intracelular que separa las células endoteliales en el lecho capilar, este mecanismo se ha denominado hemorragia por diapedesis (los eritrocitos abandonan el torrente circulatorio atravesando los orificios que quedan entre las células endoteliales), b) lesión directa de las células endoteliales de los vasos capilares, se denomina este mecanismo hemorragia por rexis (los eritrocitos se extravasaban atravesando los orificios que quedan al ser destruidas las células del endotelio).^{2,22}

c) Edema e inflamación:

En las primeras 24 horas se observa un abundante infiltrado leucocitario compuesto por polimorfonucleares, que a la semana la composición celular cambia a mononucleares. El estado inflamatorio alcanza su máxima intensidad en las primeras 8 a 24 horas del envenenamiento. La patogenia del edema es por afectación de la permeabilidad capilar y por liberación de histamina y bradiquina inducido por el veneno.^{2,22}

d) Efecto neurotóxico:

Este efecto es causado por las neurotoxinas que se encuentran principalmente en las serpientes coral.

El efecto neurotóxico producido por un polipéptido se une fuertemente al receptor colinérgico de la placa motora del músculo esquelético y produce un bloqueo presináptico o postsináptico de las uniones neuromusculares induciendo una parálisis flácida, típica de un bloqueo neuromuscular tipo curarizante, siendo la ptosis palpebral un signo distintivo frecuente.2.22

e) Involucramiento renal:

El envenenamiento por Bothrops (cabezas triangulares) y Cro-talus durissus (cascabel neotropical) puede causar una falla renal aguda. A pesar de ser multifactorial, la mayoría de los casos de falla renal después de mordidas por Bothrops son secundarios al choque hemorrágico y a la hipovolemia.2.11.22

f) Efectos Cardiovasculares:

Los venenos de serpientes, producen profundas alteraciones cardiovasculares pudiendo localizarse su efecto en corazón, capilares sistémicos, circuito pulmonar o aún en los centros bulbares.

El mecanismo de acción tanto de las cardiotoxinas como de las citotoxinas está relacionado con la presencia de receptores en la membrana celular con los cuales se combinan, desencadenando su acción. En el caso de las cardiotoxinas se producen una despolarización de las fibras de miocardio, la que se contrae, seguida de una parálisis irreversible que ocasiona un paro cardíaco.2.15.22

5.- VENENOS:2.14.17.22

Un veneno es una sustancia que a través de su acción fisiológica daña o mata un organismo. Toxina es una sustancia venenosa de origen microbiano vegetal o animal la cual es producida generalmente por glándulas exocrinas.

a) Función de los venenos:

Los venenos de animales, en general, cumplen diversas funciones en la naturaleza: defensivas, alimenticias, tal el caso de serpientes y arañas los cuales son utilizados para inmovilizar la presa e iniciar la digestión, de ataque, pero siempre con miras de defensa.

b) Capacidad de envenenamiento:

El grado de envenenamiento depende de varios factores entre los cuales se encuentran:

1.- **Ruta de Administración:** La vía por donde ingresa el veneno no sólo afecta el período de latencia, sino la duración del efecto, su toxicidad, el pH, el vehículo de transporte, el tamaño de las partículas y la concentración.

2.- **Pasaje a través de las membranas:** Las fracciones de los venenos atraviesan las membranas por medio de los siguientes mecanismos: Difusión Pasiva, Difusión Facilitada, Transporte Activo y Pinocitosis.

De los cuatro, la difusión pasiva y la difusión facilitada son los mecanismos principales.

3.- **Lugar de Acción y Metabolismo, Excreción:** Cuando el veneno ha ingresado en la circulación es distribuido en los distintos tejidos dependiendo de varios factores entre los que tenemos: el pH, la permeabilidad de las membranas, el porcentaje del veneno circulando, la cantidad de masa de tejido y, la afinidad del veneno a ciertos tejidos (receptores).

El metabolismo del veneno corre a cargo principalmente del parénquima hepático, el cual para esta función posee varias enzimas (oxidases) otros tejidos contribuyen también en parte a metabolizar el veneno.

El mejor órgano de excreción es el riñón.

c) Acciones Químicas y Farmacológicas:

Los venenos de las serpientes son una mezcla, en su mayoría de proteínas con actividad enzimática. La fracción más letal lo constituyen los péptidos y ciertas proteínas no enzimáticas. Los venenos también poseen sustancias inorgánicas como lo son ciertos metales: Sodio, Calcio, Potasio, Magnesio, Cinc y en menor cantidad Hierro, Cobalto, Manganeso y Níquel.

Algunos venenos también contienen Carbohidratos, Lípidos y Aminas.

d) Enzimas:

Los venenos pueden llegar a tener 26 enzimas diferentes; siendo las más importantes las que a continuación se describen:

Enzimas Proteolíticas: Puede haber varias enzimas proteolíticas en un mismo veneno por ejemplo Endopeptidasas y proteolasas. Los Crotálicos son los que más poseen en su veneno éste tipo de enzimas. Tienen una actividad en la destrucción de los tejidos, y se les atribuyen efectos hemolíticos y de lisis del músculo. Está bien demostrada su relación entre letalidad, necrosis, hemólisis y hemaglutinación.

Enzima Hidrolasa Angina Ester: Esta enzima está presente en los Viperidae y ausente en los Elapidae. Su acción no está bien determinada, se supone que ayuda a la liberación de bradiginina y tal vez posee cierta actividad procoagulante.

Colagenasa: Es una proteasa que desintegra el colágeno.

Hialuronidasa: Esta enzima actúa sobre la ligadura de ciertos mucopolisacáridos, dando como resultado la disminución de la viscosidad del tejido conectivo y permitiendo de ésta forma que el veneno se difunda con más facilidad. Ayuda también a extender el edema.

Fosfolipasa A2: Esta enzima está presente en los venenos de Elapidae, Crotalidae e Hidrophidae. Cataliza la hidrólisis de una grasa en su unión ester, liberando fósforos, formando lisozimas y liberando ácidos grasos. Existen diferentes formas de Fosfolipasa A2, teniendo diferentes propiedades farmacológicas y antigénicas. La actividad farmacológica de ésta enzima depende de su habilidad para romper membranas, liberando Histamina, quininas, serotoninas, acetyl colina y sustancias de liberación lenta de la anafilaxia.

La enzima tiene un efecto marcado en el metabolismo de la fosforilación oxidativa y en la inhibición de la respiración (produce depresión del SNC por anoxia). Al mismo tiempo es responsable de varios efectos hemolíticos y hemorrágicos, y esto se debe a la habilidad de hidrolizar el glóbulo rojo. A nivel del sistema circulatorio produce hipotensión, hemoconcentración e hipoproteinemia.

Fosfolipasa B: Participa en acción conjunta con la Fosfolipasa A2.

Fosfomonoesterasa: Está presente en la mayoría de los venenos y su actividad no ha sido demostrada.

Fosfodiesterasa: Esta presente en la mayoría de los venenos, su acción es a nivel de ADN y ARN. La enzima produce cambios cardiovasculares, no tiene acción sobre el SNC.

Acetilcolinesterasa: Cataliza la hidrólisis de acetilcolina, a colina y ácido acético. Está presente en los venenos de la familia Elapidae.

Ribonucleasa y Desoxiribonucleasa: No se conocen sus actividades dentro de los venenos.

5 - Nucleótidas: Está presente en los venenos de Viperidae y en menor proporción en los Elapidae.

NAD Nucleotidas: Cataliza la hidrólisis de la nicotinamida, su actividad no es conocida.

Polipéptidos: Tienen un peso molecular bajo y no tienen actividad enzimática. Están presentes principalmente en los venenos de la familia Elapidae. Se les ha denominado con el término de neurotoxinas y cardiotoxinas, se ha cristalizado una proteína denominándose crotocin, luego fue separado en crotacín de la que se extrajo crotamina. El crotacín resulto ser más letal que el crotocin, se le han encontrado los siguientes efectos fisiopatológicos: Parálisis respiratoria, efectos proteolíticos efectos neurotóxicos, hemólisis por desnaturalización de la hemoglobina, formación de coágulo de fibrina, liberación de bradisinina.

Todos los efectos farmacológicos de los péptidos no han sido determinados pero se sabe que son los responsables del shock y la hipotensión del veneno crudo, esto se debe a: incremento de la permeabilidad vascular a las proteínas plasmáticas y a la alteración de las células endoteliales de las paredes vasculares, lo que permite el escape de plasma y glóbulos rojos.

El efecto comprobado hasta el momento acerca de las neurotoxinas es el de un bloqueo en las sinapsis neuromusculares ya sea en forma presináptica, impidiendo la liberación de acetilcolina, o post-sináptica, impidiendo la combinación del neurotransmisor con el receptor colinérgico, en forma similar a la acción del curare.

e) Acciones anticoagulantes:

El fenómeno hemorrágico provocado por el veneno de serpientes es uno de los eventos más importantes en la patología del envenenamiento pudiendo manifestarse tanto en forma local como también sistémica. Los venenos de las familias Viperidae son extremadamente hemorragíparos, por lo tanto el problema está presente en el Istmo Centroamericano.

La hemorragia es provocada por toxinas específicas que lesionan el endotelio capilar provocando extravasación. Estas toxinas son conocidas como Factores Hemorrágicos. Por supuesto que el estado de anticoagulación coadyuva con el sangrado, pero por sí solo no es capaz de provocarlo.

Se ha demostrado que las hemorraginas provocan 2 tipos de efecto en los capilares: La destrucción de porciones del endotelio, formando rupturas por donde escapan los hematíes, La separación de las uniones intercelulares y la concomitante formación de rupturas.

Se nota que el veneno de las poblaciones Atlánticas de B. Asper son doblemente hemorragíparos que las del Pacífico. Esta observación también corresponde con la clínica. Estudios han demostrado que el veneno de los B. Asper jóvenes es 3 o 4 veces más hemorragíparo que el de los adultos. También se estudió que de todos los efectos farmacológicos que provocan el veneno estudiado el más fácilmente neutralizado por el suero antiofídico es la hemorragia.

f) Acciones procoagulantes:

Las proteínas de la coagulación, que son inactivadas por precursores y a la vez activadas al estar su superficie en contacto con el factor o por la vía extrínseca, la cual está activada por la liberación de tejidos.

La enzima final de la coagulación es la Trombina la cual tiene varias actividades. Convierte el Fibrinógeno en Fibrina y ésta es activada por el Factor XIII que la convierte en Fibrina Estable. La trombina controla la activación o inactivación de los factores V y VIII y juega un papel en el control del factor VII que tiene cierto control en la Vía Intrínseca.

Varias fracciones de los venenos pueden actuar como procoagulantes o anticoagulantes, dependiendo de la dosis. Esto sucede con las enzimas que semejan la Trombina, que en pequeñas dosis se vuelven procoagulantes y en grandes dosis en anticoagulantes. Esto lo pueden hacer, porque al agotarse el fibrinógeno ya no puede realizar las reacciones que controla.

Varios venenos de las serpientes contienen un amplio espectro de proteasas, las cuales pueden actuar como coagulantes o anticoagulantes y fibrinolíticos. Estos venenos proteasas pueden activar los factores IX y X de la coagulación sanguínea. Teóricamente pueden activar el factor V. Convierten también el Plasminógeno en Plasmina y activan el factor VII, y también degradan ésta proteína por un prolongado efecto proteolítico.

Activador del Factor X:

El mecanismo de estimulación depende del Calcio, la estimulación se hace por el mismo mecanismo de la activación normal, ya sea por la vía extrínseca o intrínseca. Esta proteína ha sido encontrada en varias especies.

Activador del Factor IX:

El factor IX es catalizado de una forma diferente a la fisiológica y lo hace por medio de la ruptura de un péptido, que se efectúa con la presencia del Calcio.

Activador del Factor V:

Este factor se encuentra ligado al factor X. Su mecanismo de acción es desconocido, pero se supone que es similar al factor IX (mecanismo proteolítico).

Activador Directo de la Protrombina:

Es una Metal Proteína, se encuentra presente en los venenos de Elapidae y Viperidae. La enzima difiere, en el mecanismo fisiológico, de la activación de la Protrombina. Aparentemente 1 o 2 péptidos rompen la unión de la enzima del veneno durante la activación, generando una activación catalítica intermitente. Esta actividad intermitente es la que automáticamente convierte la Trombina. Adicionalmente éstas enzimas pueden convertir la Protrombina normal que se presenta en la deficiencia de Vitamina K, en Trombina Activada.

Enzimas que Semejan la Trombina:

Los venenos de la Viperidae contienen cantidades significativas de éstas enzimas y los Elapidae e Hidrophidae tienen poca o nada.

El mecanismo por medio del cual provocan los coágulos es diferente al mecanismo formado por la Trombina. Estas enzimas lo hacen liberando solamente el Fibrinopéptido A y a veces el B, mientras que la Trombina liberando ambos.

6.- GRADOS DE ENVENENAMIENTO.^{2,6}

Grado 0: Marcas de los colmillos, edema y dolor leve.

Grado 1 (signos locales): Lo anterior más dolor moderado o intenso, eritema hasta 10 cms alrededor de la mordedura, puede haber sangrado en el sitio de la marca de los colmillos.

Grado 2 (leve): Mayor dolor edema y eritema hasta 30 cms. del sitio de la mordedura, puede haber náusea, vómito, vértigo choque, signos neurológicos y alteración de pruebas de la coagulación.

Grado 3 (moderado a grave): Dolor intenso, edema que abarca todo el miembro, flictenas, sangrado a distancia, necrosis de la piel en área afectada, petequias y equimosis.

Grado 4 (muy grave): Adenopatía a distancia, edema más allá del miembro afectado, inconciencia, IRA, secreciones sanguinolentas síntomas sistémicos, coma.

7.- TRATAMIENTO.⁸

El tratamiento de primeros auxilios y el cuidado médico de las víctimas de mordedura de serpiente, son las áreas más descuidadas y peor estudiadas de la medicina.

El tratamiento en la unidad de cuidado intensivo del choque con mediciones encajadas de la presión arterial pulmonar, podría mejorar el tratamiento de las mordeduras de cascabel (serpiente venenosa de la familia de los Crótalos).

La mayoría de las mordeduras de serpiente ocurren en el trópico rural, lejos de facilidades médicas, y sólo una minoría de las víctimas de mordedura de serpiente son hospitalizadas.

a) Primeros auxilios:

Los primeros auxilios consisten en las medidas tomadas para el paciente entre el momento de la mordedura y el momento en que el paciente llega a una facilidad de tratamiento.

Sólo pocas medidas de primeros auxilios son generalmente aceptadas. Tranquilizar al paciente. Muchos pacientes creen que después de una mordedura de serpiente, la muerte es rápida e inevitable, por lo tanto, pueden estar extremadamente atemorizados. Hay que hacerle énfasis a las víctimas que hay tratamiento disponible y que es efectivo.

Inmovilizar la extremidad mordida tanto como sea práctico, con una tablilla o cabestrillo. La contracción muscular fomenta la absorción del veneno a través de los canales linfáticos. Quitar anillos, pulseras u otros artefactos potencialmente restrictores.

Transportar al paciente, tan rápidamente como sea posible, a un lugar que proporcione atención médica, restringir la actividad física de parte del paciente a un mínimo.

Evitar procedimientos y medicinas dañinos. Pueden ser peligrosas la incisión y la succión (cortar y chupar), y la aplicación de hielo al sitio de la mordedura (crioterapia), y no son de valor comprobado. La aplicación de una corriente eléctrica al sitio de la mordedura es la medida agresiva más reciente que se recomienda en base a informes de anécdotas (Guderian et al., 1986). Es necesaria la demostración de la eficacia de esta medida, por estudios controlados, antes que pueda ser abocado este procedimiento potencialmente peligroso.

Evitar aspirina e inyecciones intramusculares. La aspirina puede agravar las tendencias a hemorragias, y las inyecciones intramusculares pueden causar grandes hematomas en los pacientes con anormalidades en cuanto a la coagulación de la sangre. Acetaminofén o fosfato de codeína por vía oral son analgésicos seguros.

Si fuese posible, antes del traslado establecer una línea intravenosa con fluido isotónico (Dextrosa en agua al 5%, salino normal, lactato de ringer). Durante el traslado observar si aparecen los siguientes problemas:

El vómito aumenta el riesgo de asfixia por que pueden bloquearse los pasajes de aire en un paciente comatoso o en uno con parálisis glossofaríngea. Colocar a tal paciente de lado para evitar que aspire el vómito y se puede administrar algún antiemético.

La obstrucción de las vías respiratorias en los pacientes mordidos por serpientes que tienen veneno neurotóxico (por ejemplo *Crotalus durissus* y *Micrurus*) puede ser causada por parálisis de la mandíbula y de la lengua, acostar al paciente de lado introducir un pasaje oral para el aire, e hiperextender el cuello, si ocurre para cardíaco o respiratorio, ejecutar la resucitación cardiopulmonar estándar (RCP).

Ordinariamente, no debe administrarse antiveneno (antiofídico) en el campo. Sólo debe ser dado por alguien que este familiarizado con su uso y que tenga las drogas de emergencia disponibles para tratar posibles reacciones adversas.

No se recomienda la aplicación rutinaria de torniquetes apretados (arteriales). Además de ser dolorosos, su uso arriesga a daño isquémico y aún gangrena. Los efectos locales del veneno pueden intensificarse y puede ocurrir una toxicidad sistémica aguda si el torniquete es repentinamente aflojado. El entablillado combinado con un vendaje apretado, es una alternativa y quizá conlleva menos riesgo.

Ocasionalmente, los pacientes desarrollan un choque antes de llegar al lugar del tratamiento, usualmente por que hay una disminución del volumen de sangre en circulación. Las manifestaciones clínicas incluyen sensorio alterado, hipotensión, taquicardia y taquipnea, pulso débil o ausente, palidez, transpiración, y piel fría. Darles a estos pacientes oxígeno si hubiese disponible. Esta indicada una expansión del volumen con cristaloides (lactato de ringier o salino normal), siempre y cuando no haya evidencia de congestión pulmonar. Una causa rara de hipotensión es el choque anafiláctico debido a los efectos autofarmacológicos del veneno. Las manifestaciones clínicas son edema angioneurótico, dolor abdominal severo, y diarrea; el mejor tratamiento es un antihistamínico intravenoso (por ejemplo, 50 mg de hidrocloreuro de difenidramina, Benadryl).

b) Tratamiento en el Hospital o Centro de Salud:

Todos los pacientes mordidos por una serpiente que se sospecha o se sabe que es venenosa, deben ser observados durante un mínimo de 24 horas y sus signos vitales monitorizados o vigilados frecuentemente. Una infusión intravenosa debe iniciarse o mantenerse para proporcionar un acceso rápido para medicamentos si el paciente lo llegase a necesitar.

En Guatemala las mordeduras por serpiente son ocasionadas mayoritariamente por *Bothrops Asper* (Barba Amarilla), *Crotalus Durissus* (Cascabel) *Atropoides Nummifer* (Mano de Piedra), *Agkistrodon Biliniatus* (Cantil de Agua), en orden descendente.

Las mordeduras por serpiente coral (*Micrurus*) son raras pero pueden ser serias. A pesar que las mordeduras por colúbridos de dientes posteriores pueden causar dolor e hinchazón, ninguna especie ha sido implicada en muertes humanas en América Latina.

c) Anti-Veneno (antiofídico):

El anti-veneno o antiofídico es el único tratamiento probado para el envenenamiento. Por ejemplo, se dice que las mordeduras, no tratadas, por *Crotalus Durissus* tienen una tasa de fatalidad del 72%. Esto se reduce al 12% con el uso del anti-veneno.

El anti-veneno sólo debe administrarse a pacientes que tengan los síntomas y las señales de envenenamiento. No sólo existe en cantidad limitada, sino también su uso indiscriminado expone, sin necesidad, a los pacientes al riesgo de las reacciones anti-veneno.

Contrariamente a la opinión pública, la mordedura de serpiente rara vez produce una muerte súbita. El intervalo promedio entre el momento de la mordedura de la serpiente venenosa (*Crótalos*) y la muerte se mide en días y no en horas. Aquellos quienes tratan a un paciente mordido por una serpiente, tienen tiempo para observar al paciente en cuanto a indicaciones específicas para el anti-veneno.

d) Indicaciones para el antiofídico:

Cualquier sangramiento espontáneo, que esté distante del sitio de la mordedura debe tomarse en cuenta. Siempre examinar cuidadosamente sangramiento de las encías; el sangramiento también puede ocurrir por la nariz, el tracto gastrointestinal, tracto urinario, los sitios de incisión y venopunción, o en otra parte.

Buscar señales de involucramiento cardiovascular, incluyendo la hipotensión, bradicardia, y arritmias, o un electrocardiograma anormal. La hipotensión o lecturas de amplias fluctuación en la presión sanguínea puede ser la primera señal de problemas serios por mordeduras de serpientes venenosas.

Verificar el involucramiento renal. La oliguria (menos de 400 ml de orina en 24 horas), niveles elevados de creatinina sérica y nitrógeno de urea sanguínea (BUN), o sangre en orina (hematuria) son señales de nefrotoxicidad y una indicación para el uso del antiofídico. También pueden estar asociados la hemoglobi-nuria y la mioglobinuria con daño renal.

Investigar señales de involucramiento del sistema nervioso, lo que puede incluir agachamiento de los párpados (ptosis), dificultad en mover los ojos (oftalmoplegia), dificultad para tragar o hablar, y dificultad para respirar. La debilidad o parálisis de los brazos y piernas son señales tardías.

La hinchazón local masiva, es decir, hinchazón que involucre más de la mitad de la extremidad mordida, o una hinchazón acompañada por la formación de ampollas, es una indicación que ha ocurrido un envenenamiento significativo.

Buscar evidencia de coagulación anormal de la sangre, o hemólisis. Si el lugar del tratamiento tiene un laboratorio bien equipado, deben llevarse a cabo exámenes estándar de coagulación de la sangre (TP, TPT, etc.). Sin embargo los exámenes sencillos de coagulación total de la sangre que pueden llevarse a cabo a la par de la cama del paciente, a veces dan resultados más rápidos y que pueden ser de más utilidad para vigilar las respuestas a una terapia. Si la sangre del paciente no coagula cuando es colocada dentro de un tubo de vidrio, limpio y seco, y se deja durante 20 minutos, es indicación para usar el antiofídico.

Las mordeduras de algunas serpientes, especialmente de algunas poblaciones de *Crotalus durissus*, pueden resultar en hemólisis, el rompimiento de los glóbulos rojos. La evidencia de laboratorio de hemólisis incluye niveles aumentados de bilirrubina no conjugada (Indirecta) y disminución o falta de haptoglobina. Si la hemólisis es sustancial, el paciente puede estar icterico. La presencia orina oscura sugiere hemoglobinuria. El plasma de los pacientes con hemoglobinuria tiene un color café-rojizo. La presencia de evidencia de hemólisis, ictericia adquirida, o hemoglobinuria en laboratorio son indicaciones para el uso de antiofídicos.

Mionecrosis y mioglobinuria probablemente ocurran en algunas mordeduras por *C. durissus* y posiblemente por mordeduras de *Micrurus* sp.. La coexistencia de orina oscura con plasma de color normal, sugiere esta complicación. Son encontrados valores elevados de creatinina fosfoquinasa sérica (CPK), aldolasa, lactato de deshidrogenasa (LDH), y transaminasa oxalacética (SGOT), si estuvieran disponibles estas pruebas. La detección de mioglobina en el suero y en la orina es confirmatoria, pero éstas pruebas solo se hacen en pocos centros altamente especializados.

Fiebre, leucocitosis, y vómito son señales no específicas útiles que indican que pudo haber ocurrido envenenamiento, a pesar que no son por si solas indicaciones para el uso de antiofídico. También son claves útiles para ver si hay envenenamiento la linfangitis o linfadenopatía regional blanda, especialmente en mordeduras por serpientes venenosas (de la familia de crotalos).

Notar estas precauciones al intentar diagnosticar envenenamiento. Una hinchazón local menor, que está limitada al área al rededor de la mordida, no es una indicación para usar el antiofídico o anti-veneno. Una parestesia y entumecimiento generalizados, a menudo son señales de hiperventilación y no de neurotoxicidad. Estas y otras manifestaciones de ansiedad, incluyendo mareo, falta de aire, palpitaciones, y transpiración son indicaciones para tranquilizar al paciente y a veces, para darle un sedante suave, no un anti-veneno.

Las indicaciones para el uso del antiofídico después de mordeduras de las serpientes corales, no son como las demás para las otras especies. A pesar de que son raras, las mordeduras por estas serpientes pueden ser seguidas de un largo período asintomático, y un ataque súbito y repentino de síntomas paralíticos que pueden ser difíciles de invertir con el anti-veneno. Por lo tanto el anti-veneno o antiofídico debe suministrarse si hay un alto índice de sospecha de mordedura por serpiente coral, y hay presntes perforaciones en la piel, aún antes que haya señal de envenenamiento neurotóxico. Síntomas no específicos que son útiles son el adormecimiento o debilidad en la extremidad mordida, falta de hinchazón local, y dolor abdominal severo.

e) Contraindicaciones Para el Uso del Anti-veneno o Antiofídico:

Las mordeduras de serpientes con envenenamiento debieran ser consideradas como una emergencia médica. No hay contraindicación absoluta para el tratamiento con anti-veneno o antiofídico. Sin embargo, individuos con una historia de alergia al suero de caballo, tienen un riesgo aumentado de desarrollar reacciones severas hacia el anti-veneno y sólo debe dárseles el anti-veneno si el riesgo de muerte por envenenamiento es alto. La epinefrina, antihistamínico y corticosteroides pueden darse a estos pacientes de antemano. No se recomienda una rápida desensibilización. El anti-veneno o antiofídico debe ser administrado con alta precaución a los pacientes que tienen historia de fiebre de heno, asma o eczema.

f) Selección del Anti-veneno o Antiofídico:

Si se conoce la especie de la serpiente mordedora, debe usarse el anti-veneno o antiofídico específico para esa serpiente (anti-veneno monovalente). De lo contrario, son indicados los antiofídicos que son efectivos contra varias especies de serpientes (anti-veneno polivalente). La descripción de la serpiente y el conocimiento de esas especies que se encuentran en una localidad particular, pueden ayudar a identificar a la serpiente mordedora.

El anti-veneno o antiofídico para una especie dentro de un género, puede no neutralizar efectivamente el veneno de otra especie, por lo que es importante leer cuidadosamente el folleto anti-veneno que es proporcionado por el fabricante. Wyeth produce un anti-veneno (antiofídico) polivalente (Crotalidae) que la compañía dice que puede usarse para el tratamiento de todas las mordeduras por serpientes venenosas (de la familia crótalos) en el nuevo mundo; desafortunadamente, su costo prohíbe una distribución y un uso difundidos. Ocasionalmente, sólo hay disponible anti-veneno que ya ha llegado a su fecha de vencimiento; sin embargo, si ha sido almacenado adecuadamente, puede ser todavía efectivo. No debe usarse un anti-veneno o antiofídico opaco o turbio. La precipitación de proteína indica la pérdida de actividad y un riesgo aumentado a las reacciones del anti-veneno.

g) Administración del Anti-veneno o Antiofídico:

Dosificación: Desafortunadamente, variables tales como cantidades distintas de venenos introducidas por la serpiente y las velocidades distintas de absorción del veneno desde el sitio de la mordida, hacen imposible predecir cuánto anti-veneno será requerido para un paciente individual. La dosis inicial apropiada de anti-veneno ha sido establecida en muy pocos casos. Las recomendaciones del fabricante usualmente están basadas en pruebas de protección de ratones, que pueden no reflejar la situación de la vida real. En la enorme mayoría de los casos, hay tiempo adecuado para monitorizar o vigilar las respuestas del paciente; debe darse algo del anti-veneno o antiofídico inicialmente, y puede luego darse más de acuerdo a las respuestas del paciente. Escoger la dosis inicial de acuerdo a las recomendaciones del fabricante; 50 ml es una dosis promedio. A los niños deben dárseles dosis iguales o mayores que a los adultos porque el volumen del veneno inyectado es distribuido en un volumen más pequeño del fluido corporal. Darle una dosis inicial grande a los pacientes que tengan envenenamiento severo, tan pronto como sea posible.

h) Monitarización o vigilancia de la respuesta al anti-veneno:

Con una dosis neutralizante adecuada del anti-veneno, usualmente se detiene la hemorragia sistémica espontánea dentro de una hora. El regreso de la coagulación sanguínea a la normalidad toma más tiempo, y la prueba sencilla de coagulación total de la sangre repetida a intervalos de 6 horas es una manera muy conveniente de monitorizar la efectividad de la terapia. La depuración o limpieza de la hemoglobinuria o mioglobulinuria puede verse fácilmente en un paciente cateterizado. La estabilización de la presión sanguínea y del pulso, y el retorno a la normalidad de los cambios electrocardiográficos indican una buena respuesta al anti-veneno en pacientes que están hemodinámicamente inestables o quienes tienen señales cardiotóxicas. Disminución de ptosis y un incremento en el número de segundos que puede mantenerse la vista hacia arriba, significan una mejoría a la neurotoxicidad. Si no se ve respuesta alguna al anti-veneno o antiofídico, debe probarse una dosis aumentada. Si las señales del envenenamiento no son controladas, puede administrarse anti-veneno o antiofídico cada 1-2 horas.

i) Prueba de sensibilidad:

Para su aplicación se empleará, diluyendo un vial de 10 ml. en 500 ml. de solución salina o glucosada (1:50), vía intravenosa lo cual evidenciará si existe hipersensibilidad. De ser bien tolerado, se incorporarán el resto de los frascos necesarios.

j) Vía de administración:

El anti-veneno o antiofídico siempre debe administrarse intravenosamente. Idealmente, se diluye hasta 500 ml de fluido isotónico y es dado por infusiones intravenosas durante 1 a 2 horas. El volumen de la dilución debe reducirse en niños pequeños o recién nacidos. Si existe duda en cuanto a que el paciente puede ser observado durante el tiempo de la infusión, un método alternativo es darle el anti-veneno sin diluir por medio de un empuje intravenoso lento durante 10-15 minutos. No está indicada la infiltración del anti-veneno en el sitio de la mordida; sólo si no es posible el acceso intravenoso, deberá usarse la vía intramuscular o subcutánea.

k) Momento para tratamiento con anti-veneno o antiofídico:

Nunca es demasiado tarde para tratar el anti-veneno, siempre y cuando las indicaciones para su uso estén presentes. La habilidad de coagulación de la sangre ha sido restaurada 10 días o más después de algunas mordidas por serpientes venenosas. Si un paciente, quien tiene un torniquete en su lugar, ha de ser tratado y hay evidencias de envenenamiento, darle el anti-veneno antes de soltar el torniquete. Si están ausentes las señales de envenenamiento, poner el puño de un esfigmomanómetro arriba del torniquete e inflarlo más allá de la presión sanguínea diastólica. Con una línea intravenosa en su lugar y el anti-veneno a la par de la cama, soltar el torniquete y desinflar el esfigmomanómetro muy gradualmente. Nunca remover rápidamente el torniquete de una víctima de mordedura de serpiente, sin tomar estas precauciones.

l) Reacciones del anti-veneno o antiofídico:

Las reacciones tempranas usualmente empiezan entre 1 y 20 minutos de haber empezado la inyección intravenosa del antiveneno sin diluir y entre 30 y 180 minutos después de haber iniciado una infusión intravenosa del anti-veneno. (Estas reacciones también son referidas como "anafilaxis" o "anafilactoides", a pesar de que su patofisiología no está clara y puede no tener una base alérgica). Pruebas de la piel y de la conjuntiva son predictores no confiables de reacciones tempranas y pueden ser peligrosas. No llevar a cabo pruebas de la piel a menos que sean requeridas por razones médico-legales.

Los síntomas de advertencia incluyen palpitaciones, una sensación de calor, intranquilidad, tos, picazón del cuero cabelludo, náusea, y vómitos. Después, se hacen evidentes urticaria, picazón generalizada, fiebre y taquicardia. Rara vez, ocurren manifestaciones severas potencialmente fatales, incluyendo hipotensión, broncoespasmos y obstrucción de las vías respiratorias.

La epinefrina es el tratamiento seleccionado para reacciones tempranas y siempre debe estar fácilmente accesible en cualquier momento que sea usado el anti-veneno. Si se desarrollan los síntomas de advertencia, dejar de suministrar el antiveneno y dar de 0.3 a 0.5 mgs de epinefrina subcutáneamente.

Pueden ser administrados intravenosamente 25 a 50 mgs de difenhidramina para acortar la duración de la reacción y prevenir recaídas. Puede entonces reiniciarse el antiveneno lentamente.

Si ocurre asma, hinchazón de las vías respiratorias superiores, o hipotensión, discontinuar el antiveneno, y administrar epinefrina intravenosamente. Si persisten señales de envenenamiento severo, debe darse más anti-veneno, puede reiniciarse lentamente el goteo del anti-veneno; asegurarse que la epinefrina este a la par de la cama. Una alternativa es reiniciar el anti-veneno mientras se esta dando la epinefrina (1:1000) por medio de una infusión constante (1 ml en 250 ml de dextrosa en agua al 5%) deben mantenerse abierta las vías respiratorias y la presión sanguínea por métodos normales. Deben darse antihistamínicos durante 24 hrs. después que ocurra una reacción temprana.

Las reacciones de enfermedad sérica pueden desarrollarse entre 5 y 24 días después que ha sido suministrado el antiveneno. Urticaria, fiebre, dolores en las articulaciones son los síntomas más comunes y son fácilmente controlados con un curso corto de antihistamínicos y esteroides (por ejemplo 40 mg/día de prednisona, disminuyendo durante 3 a 4 días). Esta es la única indicación establecida para el uso de esteroides en el tratamiento de mordeduras de serpientes.

m) Cuidado del sitio de la mordedura y de la extremidad mordida:

En casos no complicados, mantener limpio y descubierto el sitio de la mordida. Elevar las extremidades mordidas que estén hinchadas, y dejar sin tocar las ampollas. Los antibióticos profilácticos no están indicados; sin embargo, la profilaxis contra el tétano con un refuerzo debe darse a menos que se sepa que el paciente ha sido inmunizado verídicamente.

La necrosis local severa debe ser tratada por medio de desbridamiento quirúrgico, raspado inmediato de la piel rota, y antibióticos, tal como el METRONIDAZOL, que es efectivo contra bacilos gram negativos, así como los anaerobios. El manejo quirúrgico rápido y cuidadoso es la clave para minimizar los daños en casos complicados por la necrosis.

Un edema tenso en la extremidad mordida rara vez conlleva a compromiso vascular ni necrosis. Debe tomarse la decisión de hacer una fasciotomía para aliviar la presión sólo si puede demostrarse una presión elevada del tejido o una estrechez severa de un vaso principal por medio de doppler, angiografía o medida de la presión subfascial. La fasciotomía debe hacerse sólo después que la sangre tenga de nuevo la habilidad para coagularse. Esto puede acelerarse administrando sangre fresca completa o factores coagulantes entre 30 y 60 minutos después de una dosis adecuada de antiveneno.

n) Choque:

Pacientes pueden filtrar grandes cantidades de plasma y de sangre dentro de la extremidad hinchada. El antiveneno usualmente detiene efectivamente más pérdida de fluidos así como el sangramiento de otros sitios. Sin embargo, si se desarrolla un colapso circulatorio o ya está presente, a veces debe llevarse a cabo un adecuado esparcimiento de tejido con sangre fresca completa, un expansor de plasma, salino normal, o lactato de ringier. El antiveneno por sí solo no es suficiente. El choque puede desarrollarse después de mordeduras por *C. Durissus* a pesar de la falta de hinchazón local.

o) INVOLUCRAMIENTO RENAL:

Muchas veces, esta complicación puede prevenirse poniendo una atención cuidadosa en mantener el volumen adecuado de sangre circulante y el equilibrio de fluidos. Es necesario un manejo médico hábil para tratar una falla renal establecida y, ocasionalmente, puede ser requerida una diálisis en casos que no respondan a la terapia conservadora. Sin embargo, la diálisis peritoneal en un hospital rural comúnmente se complica por infección secundaria y hemorragia y es alta la mortalidad. La hemodiálisis raramente está disponible en las áreas en donde es alto el índice de mordeduras por serpiente.

La hemólisis intravascular puede ocurrir después de mordidas por la *C. Durissus*. Los pigmentos de los glóbulos rojos filtrados por los riñones no sólo le da un color café-rojizo a la orina, sino también aumentan el riesgo de un fallo renal. El veneno del *C. Durissus Terrificus* también tiene un efecto nefrotóxico directo y un posible efecto miotóxico; la mioglobinuria ayuda al daño renal. La falla renal es la principal causa de muerte después de mordeduras por ésta serpiente.¹⁰

p) ENVENENAMIENTO NEUROTOXICO:

Los pacientes con parálisis de los músculos de la mandíbula y la lengua, así como parálisis de los músculos de la tos y de tragar, están en alto riesgo para una neumonía por aspiración y asfixia por bloqueo en las vías respiratorias. Estos pacientes debieran ser puestos sobre un lado y hacerles succiones frecuentes. Introducir un paso de aire oral e hiperextender el cuello. A pesar de que los signos neurotóxicos leves son vistos frecuentemente después de las mordidas por *Crotalus durissus* es muy probable que ocurra una neurotoxicidad severa después de una mordedura por *Micrurus*.

Si se desarrolla una parálisis respiratoria, mantener una ventilación adecuada por cualquier medio que esté disponible. Los pacientes se han recuperado de las parálisis respiratorias después de haber sido ventilados manualmente por medio de relevos de parientes o enfermeras durante diez días. Son peligrosas las intubaciones endotraqueales o traqueostomías si no hay una supervisión adecuada para asegurar una succión frecuente y un humedecimiento adecuado.

El sulfato de atropina (0.6 mg para adultos, 50 microgramos/kg para niños) es dado por medio de una inyección intravenosa seguida por Tensilón (10 mg para adultos, 0.25 mg/kg para niños). Si ocurre una mejoría, el paciente puede ser mantenido entonces en una preparación más prolongada de anticolinesterasa, tal como sulfato de metilo de neostigmina. Los efectos secundarios de la anticolinesterasa, tal como calambres abdominales, pueden ser controlados rápidamente administrando atropina.

q) COAGULOPATIA:

El método más efectivo para invertir la coagulopatía es la terapia con anti-veneno. Las mordeduras por Bothrops a veces producen una coagulación intravascular diseminada gradual, resultando en una fibrinólisis y ocasionalmente en trombocitopenia. Aunque estuvieran disponibles, los crioprecipitados tienen un efecto benéfico más corto para tratar este sistema que el anti-veneno. El uso de heparina no se recomienda.

18.- ANTIVENENOS ACCESIBLES EN GUATEMALA.²²

FABRICANTE	NOMBRE	VENENOS UTILIZADOS	COMENTARIOS
Wyeth Laboratories Philadelphia USA	Antivenin (Crotalidae) Polyvalent Antivenin (Micrurus fulvius)	Crotalus atrox G. Adamanteus C. durissus t. B. Asper M. fulvius	Precipitados con (NH ₄) ₂ SO ₄ Liofilizados.
Laboratorios "M y N" S.A. México D.F.	Bothrópico Monovalente Polivalente	B. asper B. asper C. durissus C. tigris C. atrox	Digeridos con pepsina; preci- pitados con (NH ₄) ₂ SO ₄ Liofilizados. Equinos.
Instituto Clodomiro Picado San José C.R.	Polivalente Anti- lachésico Anticoral Anticoral polivalente Anti-M mipartitus	Lachesis muta C.d.durissus B. Asper L. muta Micrurus nigrocinctus M.nigrocinctus M.mipartitus M.frontalis M.mipartitus	Equino y ovino Precipitados con (NH ₄) ₂ SO ₄ líquidos y liofilizados

c) TRATAMIENTO ETNOMEDICO EN EL
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

De la población rural y urbana de Jutiapa a la cuál se le preguntaba acerca de los distintos tipos de tratamiento que se utilizaban en la región, para las personas que sufrían una mordedura de serpiente, se pudieron obtener los siguientes tratamientos etnomedicos:

JUGO DE LIMON: Refieren que 1 ó 2 vasos ingeridos inmediatamente después del accidente ayudan a "cortar" el veneno.

CHALCHUPA (*Rauvolfia tetraphylla*): Se menciona que su fruto o sus hojas machacadas o molidas en regular cantidad, se colocan sobre la lesión por 1 ó 2 días. La masa la cambian cada día.

CURARINA (*Cissampelos pareira*): Maceran regular cantidad de hojas (2-3), luego la colocan en el sitio de la lesión; también hierven algunas hojas y se las dan a beber al paciente en cantidad que tolere. También refieren el uso de curarina en preparado vendido en farmacias, en cantidad de 1 - 2 vasos; lo cual vuelven a repetir si no surte el efecto esperado.

En Asunción Mita refiere una persona el uso de una planta llamada Crucita, la que colocan sobre la herida en forma de masa y dándole a beber 2 ó 3 vasos cada día del agua preparada de esa misma planta durante 2 ó 3 días.

Entre otros tratamientos se pueden mencionar el uso de aceite de cocina y otros catárticos para "lavar" el veneno.

NOMBRES QUE SE LES DAN A LOS OFIDIOS EN EL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA.

NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN
Micrurus	Coral
Crotalus Durissus	Cascabel, vibora de Cascabel.
Porthidium Ophryomegas	Vibora Castellana, Timbo.
Cerrophidium Godmani	Cantil Frijolillo.
Agkistrodon Biliniatus	
Biliniatus	Cantil de Agua.
Bothrops Asper	Barba Amarilla.

VI.- METODOLOGIA

A.- TIPO DE ESTUDIO:

Debido a que en la actualidad no se cuenta con estadísticas confiables sobre accidente ofídico en Guatemala, se realizó un estudio retrospectivo-descriptivo en el Departamento de Jutiapa que abarcó un período de seis años (1987 - 1992).

B.- SELECCION DEL SUJETO DE ESTUDIO:

El universo está representado, en el estudio, por todos los registros médicos de pacientes que tuvieron diagnóstico y tratamiento para mordedura de serpiente (accidente ofídico), en las distintas instituciones de salud del Departamento de Jutiapa del 1 de Enero de 1987 al 31 de Diciembre de 1992.

C.- CRITERIOS DE INCLUSION:

Se incluyeron todos los registros médicos de pacientes con diagnóstico y tratamiento para mordedura de serpiente, de ambos sexos, del 1 de Enero de 1987 al 31 de Diciembre de 1992.

D.- CRITERIOS DE EXCLUSION:

Se excluyeron todos los registros médicos de pacientes con diagnóstico diferente a mordedura de serpiente.

E.- METODO DE RECOLECCION:

Se revisaron las formas F-4 y F-6 de los distintos Puestos, Centros de Salud y Hospitales correspondientes al Departamento de Jutiapa, de donde se obtuvieron los números registro de historia clínica de los pacientes atendidos por mordedura de serpiente. Luego, se procedió a examinar las fichas clínicas de donde se obtuvieron los datos especificados en la boleta de registro sobre accidente ofídico (ver anexo # 5).

F.- ANALISIS DE DATOS:

Los datos fueron ingresados posteriormente al programa EPI-INFO versión 5.0, para ser tabulados y luego analizados por el estudiante investigador.

G.- RECURSOS:**G1.- HUMANOS:**

- 1.- Personal de las bibliotecas utilizadas para la consulta del material bibliográfico.
- 2.- Personal médico, paramédico y administrativo de las distintas instituciones donde se recabó la información.
- 3.- Personas del área de estudio que se dedica a la etnomedicina.

G2.-MATERIALES:

- 1.- Revistas, libros y tesis relacionados con el tema a investigar.
- 2.- Hojas de registro sobre accidente ofídico.
- 3.- Archivo y registros médicos de hospitales y centros de salud del área a estudiar.
- 4.- Vehículo de transporte.

VARIABLES

VARIABLE	DEF. CONCEPTUAL	DEF. OPERATORIA	INDICADOR
Institución	Lugar donde se recaba información	Escribir el lugar donde se obtiene la información	Hospital Centro Salud A Centro Salud B
Localidad	Nombre de la región donde se encuentra ubicada la institución	Escribir el nombre de la Localidad	Cabecera Deptl Municipio
Nombre del Paciente	Nombre propio que lo diferencia de los demás	Se anotará el nombre del Pte.	Nombre
Registro Médico	Número que se asigna a cada registro médico	Anotar el número de registro	Número de Registro
Edad	Tiempo que una persona ha vivido desde el nacimiento a la fecha del accidente ofídico	Se anotarán en años la edad del paciente	Años
Sexo	Característica que identifica al hombre y mujer	Subrayar el sexo a que pertenece	1) Masculino 2) Femenino
Profesión u Oficio	Actividad que realiza para obtener bienes	Anotar profesión u oficio	
Domicilio	Lugar donde actualmente vive	Anotar el lugar donde vive	
Fecha del accidente	Fecha en que ocurrió el accidente ofídico	Anotar fecha en que sucedió el accidente	Día, mes, año
Fecha de consulta	Fecha en que Pte. consultó a la institución	Anotar fecha de consulta	Día, mes, año
Fecha de ingreso	Fecha en que se dio ingreso al Pte.a la institución	Anotar fecha de ingreso	Día, mes, año

cont. variables...


VARIABLE	DEF. CONCEPTUAL	DEF. OPERATORIA	INDICADOR
Fecha de egreso	Fecha en que se dio egreso al Pte.de la institución	Anotar fecha de egreso	Día, mes, año
Lugar donde ocurrió el accidente	Area geográfica donde ocurrió accidente	Anotar lugar	Finca, aldea municipio departamento
Características del lugar del accidente	Morfología del lugar del accidente	Anotar lugar	Area, población bosque,río
Actividad desarrollada en el momento del accidente		Anotar actividad	trabajo, paseo otro
Area anatómica lesionada	Región específica del cuerpo donde ocurrió la lesión	Anotar región	1. Pie der. 2. Pie izq. 3. Pierna der. 4. Pierna izq. 5. Muslo 6. Gluteo 7. Mano der. 8. Mano izq. 9. Anteb. der. 10. Anteb. izq. 11. Brazo 12. Cuello 13. Cabeza 14. Otro
Ofidio que ocasionó el accidente	Nombre de la serpiente que ocasionó el accidente	Anotar nombre de la serpiente	1. Barba Amarilla 2. Cascabel 3. Cantil 4. Coral 5. Gushnayera 6. Desconocida 7. Otra
Evolución del caso	Manifestaciones que predicen resolución del accidente	Anotar evolución	Buena, Mala

cont. variables...

VARIABLES	DEF. CONCEPTUAL	DEF. OPERATORIA	INDICADOR
Complicaciones	Manifestaciones que ocurren	Anotar complicación	1. Ninguna 2. Infección 3. Necrosis 4. Shock 5. Parálisis 6. Hemorragia 7. Otra
Secuelas	Características del efecto del accidente ofídico	Anotar secuela	1. Ninguna 2. Limitación movimientos 3. Limitación de función 4. Pérdida de sustancia 5. Amputación 6. Lesión Neurológica 7. Otra
Condición d egreso	Características del caso al momento del egreso del Pte.	Anotar condición al egreso	1. Caso concluido 2. Pendiente cirugía 3. Cita a fisioterapia 4. Muerto 5. Otro

EJECUCION DE LA INVESTIGACION

A.- GRAFICA DE GANTT



B.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GRAFICA DE GANTT

- 1.- Selección del tema del proyecto de investigación.
- 2.- Elección de asesor y revisor.
- 3.- Recopilación de material bibliográfico.
- 4.- Elaboración del proyecto conjuntamente con el asesor y revisor.
- 5.- Aprobación del proyecto por la comisión de tesis.
- 6.- Diseño del instrumento que se utilizará para la recopilación de la información.
- 7.- Ejecución del trabajo de campo o recopilación de la información.
- 8.- Procesamiento de los datos, elaboración cuadros y gráficas.
- 9.- Análisis y discusión de resultados.
- 10.- Elaboración de conclusiones, recomendaciones y resumen.
- 11.- Presentación de informe final para correcciones.
- 12.- Aprobación del informe final.
- 13.- Impresión del informe final y administrativos.
- 14.- Examen público y defensa de tesis.

VII.- PRESENTACION DE
RESULTADOS


CUADRO No. 1

DISTRIBUCION DE CASOS POR GRUPO ETAREO Y SEXO.
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
ENERO 1987 - DICIEMBRE 1992.

EDAD	SEXO					
	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL	%
0 - 9	5	8.06	2	3.22	7	11.29
10-19	11	17.7	5	8.06	16	25.81
20-29	7	11.2	4	6.45	11	17.74
30-39	10	16.1	1	1.61	11	17.74
40-49	5	8.06	4	6.45	9	14.52
50-59	4	6.45	1	1.61	5	8.06
60-69	1	1.61	1	1.61	2	3.23
70-79	00	00	00	00	00	00
80-89	1	1.61	00	00	1	1.61
90- +	00	00	00	00	00	00
TOTAL	44	70.97	18	29.03	62	100

Fuentes: Boletas de registro sobre accidente ofidico.

GRAFICA No. 1



FUENTE: BOLETA DE REGISTRO SOBRE ACCIDENTE OFIDICO.


CUADRO # 2

DISTRIBUCION DE CASOS DE ACCIDENTE OFIDICO POR MES Y AÑO.
 DEPARTAMENTO DE Jutiapa
 ENERO 1987 - DICIEMBRE 1992.

M E S	A N O						TOTAL
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	
ENE	0	1	0	0	1	0	2
FEB	0	2	1	0	1	0	4
MAR	0	0	0	0	1	0	1
ABR	0	1	0	0	0	0	1
MAY	0	0	3	0	2	1	6
JUN	0	0	1	1	0	1	3
JUL	1	4	0	1	0	2	8
AGO	3	2	2	2	0	3	12
SEP	3	1	1	1	0	4	10
OCT	0	0	0	1	1	2	4
NOV	0	1	3	1	4	2	11
DIC	0	0	0	0	0	00	00
TOTAL	7	12	11	7	10	15	62


FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofidico.

GRAFICA No. 2A.
CASOS DE ACCIDENTE OFIDICO POR MES
1987-1992 DEPTO. DE JUTIAPA



FUENTE: BOLETA DE REGISTRO SOBRE ACCIDENTE OFIDICO.

GRAFICA No. 2B.



FUENTE: BOLETA DE REGISTRO DE ACCIDENTE OFIDICO.

CUADRO # 3

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN OCUPACION.
DEPARTAMENTO DE Jutiapa
ENERO 1987 - DICIEMBRE 1992.


OCUPACION	FRECUENCIA	PORCENTAJE
AGRICULTOR	20	32.26
OF. DOMESTICOS	13	21
DESCONOCIDO	15	24.2
ESTUDIANTE	10	16.1
CARPINTERO	2	3.23
OTRO	2	3.23
TOTAL	62	100.00

FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofidico.

GRÁFICA NO. 2A

GRAFICA No. 3

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN OCUPACION
DEPTO. JUTIAPA 1987 - 1992



FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofidico.


CUALRO # 4

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN CENTRO DE ATENCION.
 DEPARTAMENTO DE Jutiapa
 ENERO 1987 - DICIEMBRE 1992.

CENTRO DE ATENCION	FRECUENCIA	PORCENTAJE
C.S. ASUNCION MITA	6	9.7
C.S. AGUA BLANCA	1	1.61
C.S. EL PROGRESO	1	1.61
OTROS C. DE SALUD	0	0.00
HOSP. NACIONAL DE JUTIAPA.	54	87.08
TOTAL	62	100.0

FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofidico.

GRAFICA No. 4



FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofldico.

CUADRO # 5

RELACION ENTRE ESPECIE Y CARACTERISTICAS
DEL LUGAR DEL ACCIDENTE OFIDICO.
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Enero 1987 - Diciembre 1992.

CARACTERISTICA	E S P E C I E			TOTAL
	C.D. ¹	CORAL	DESC. ² ₃	
AREA POBLADA	00	00	2	2
PLANTACION	6	2	19	27
BOSQUE	0	0	0	0
LAGUNA Y RIO	0	0	3	3
CAMPO ABIERTO	4	2	10	16
DESCONOCIDO	0	0	14	14
TOTAL	10	4	48	62


FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofidico.

1) *Crotalus durissus*.

2) Desconocida.

3) En desconocido se incluye el caso de vibora castellana en campo abierto.

GRAFICA No. 5



FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofídico.


CUADRO # 6

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN CARACTERISTICAS
 DEL LUGAR DEL ACCIDENTE Y ACTIVIDAD DESARROLLADA
 DEPARTAMENTO DE Jutiapa
 ENERO 1987 - DICIEMBRE 1992.

CARACTERISTICAS	ACTIVIDAD			TOTAL
	TRABAJO	PASEO	OTRO	
AREA POBLADA	2	0	0	2
PLANTACION	27	0	0	27
BOSQUE	0	0	0	0
RIO Y LAGUNA	0	3	0	3
CAMPO ABIERTO	0	0	16	16
DESCONOCIDO	0	0	14	14
TOTAL	29	3	30	62

FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofidico.

GRAFICA No. 6



FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofídico.

CUADRO # 7


DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN
 AREA ANATOMICA LESIONADA.
 DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
 ENERO DE 1987 - DICIEMBRE DE 1992.

AREA ANATOMICA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
PIE DERECHO	8	12.50
PIE IZQUIERDO	5	7.82
PIERNA DERECHA	4	6.25
PIERNA IZQUIERDA	2	3.12
MUSLO	1	1.56
MANO DERECHA	9	14.10
MANO IZQUIERDA	6	9.38
ANTEBRAZO DERECHO	3	4.69
ANTEBRAZO IZQUIERDO	3	4.69
CABEZA	2	3.12
DESCONOCIDO	22	3.12
TOTAL	65	100.00

FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofidico.

Se reporta el caso de un paciente mordido en 3 sitios diferentes.

GRAFICA No. 7



FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofidico

CUADRO # 8


DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN EVOLUCION Y COMPLICACIONES
 DEPARTAMENTO DE Jutiapa
 ENERO 1987 - DICIEMBRE 1992.

COMPLICACIONES	EVOLUCION			TOTAL
	BUENA	MALA	REFERIDO ¹	
NINGUNA	33	0	0	33
INFECCION	6	1	1	7
NECROSIS	0	2	2	2
SHOCK	0	0	0	0
HEMORRAGIA	6	3	3	9
DESCONOCIDAS ¹	3	0	8	11
TOTAL	48	6	14	62

FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofidico.

¹ Pacientes referidos de Centros y puestos de Salud hacia hospitales de la Cabecera Departamental.

GRAFICA No. 8



FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofldico.

CUADRO # 9

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN COMPLICACIONES Y SECUELAS
 POR ACCIDENTE OFIDICO.
 DEPARTAMENTO DE Jutiapa
 ENERO 1987 - DICIEMBRE 1992.

COMPLICACIONES	SECUELA			TOTAL
	NINGUNA	PERDIDA SUSTANCIA	REFERIDO ¹	
NINGUNA	33	0	0	33
INFECCION	6	0	1	7
NECROSIS	0	0	2	2
SHOCK	0	0	0	0
HEMORRAGIA	6	0	3	9
DESCONOCIDO. ¹	0	0	11	11
TOTAL	45	0	17	62


FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofidico.

¹ Pacientes referidos de Centros y Puestos de Salud para
 Hospitales de la Asociación Republicana.

GRAFICA No. 9

CASOS SEGUN COMPLICACIONES Y SECUELAS

DEPTO. JUTIAPA 1987 - 1992



FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofidico.


CUADRO # 10

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGUN CONDICIÓN AL EGRESO.
DEPARTAMENTO DE Jutiapa
ENERO 1987 - DICIEMBRE 1992.

CONDICION DE EGRESO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
CASO CONCLUIDO	39	63
REFERIDO ¹	6	9.7
DESCONOCIDO	17	27.3
TOTAL	62	100

FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofídico.

GRAFICA No. 10



FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofidico.


CUADRO No. 11

DISTRIBUCION POR ESPECIE DE SERPIENTE Y EVOLUCION
EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
DE ENERO 1987 A DICIEMBRE 1992.

SERPIENTE	FRECUENCIA	EVOLUCION		
ESPECIE	CASOS	BUENO	MALO	DESCONOCIDO
CASCABEL	10	6	4	4
CORAL	4	4	0	0
V. CASTELLANA	1	1	0	0
DESCONOCIDA	47	29	2	18
TOTAL	62	40	6	22

Fuente: Boleta de registro sobre accidente ofídico.

GRAFICA No. 11



FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofídico.

CUADRO No. 12

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN LA HORA EN QUE
OCURRIO EL ACCIDENTE OFIDICO
EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
ENERO 1987 A DICIEMBRE 1992.


HORA	NUMERO DE CASOS	PORCENTAJE
AM	14	22.6%
PM	16	25.8%
NOCHE	6	9.7%
DESCONOCIDO	26	41.9%
TOTAL	62	100.00%

Fuente: Boleta de registro sobre accidente ofidico.

GRAFICA No. 12

CASOS SEGUN LA HORA DEL ACCIDENTE

DEPTO. JUTIAPA 1987 - 1992



FUENTE: Boleta de registro sobre accidente ofídico.

VIII. - ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

Luego de realizada la presente investigación, se observaron varios aspectos interesantes que se presentan a continuación:

Según la distribución de sexo y grupos de edades, el primer lugar lo ocupa el rango de edad comprendido entre los 10 y 19 años, con un 25.81% de casos, seguido del grupo comprendido entre los 20 y 39 años, con un 35.48% en accidente ofídico. Lo anterior se debe probablemente a que en estos rangos de edad, se encuentra la mayoría de la población económicamente activa de nuestro país. En cuanto al sexo, la gran mayoría de los afectados son de sexo masculino (70.97%), debido a que es éste sexo el que más se dedica a las labores agrícolas. (cuadro 1)

Según los datos recabados, en los últimos seis años el mes donde más casos se encontraron es agosto con 12 casos, seguido de noviembre con 11 casos, lo anterior puede deberse a que en estas fechas se lleva a cabo la siembra y la cosecha de los diferentes productos agrícolas del departamento de Jutiapa. El año en el cual más casos se encontraron fue 1982, con 15 casos, seguido de 1986 con 12 casos. (Cuadro 2)

La distribución de casos según la ocupación, mostró, que 20 que equivale al 32.26% se dedican a la agricultura, encontrándose en segundo lugar los oficios domésticos con 13 casos que equivale al 21% de la población afectada.

En el caso de los agricultores son personas que se encuentran en el grupo de mayor riesgo, ya que trabajan en el habitat natural de las serpientes, y los expone a ser presa fácil del ofidio, al sentirse éste amenazado. En cuanto a los oficios domésticos, en el área rural, las mujeres se dedican a la recolección de leña, agua, lavado de ropa (a la orilla de los ríos), y ocasionalmente ayudan en las labores agrícolas. Es de hacer notar que 7 casos encontrados que equivale al 11.3% se dieron en niños menores de 10 años, quienes ayudan a sus padres en las tareas diarias. (Cuadro 3)

La distribución de casos según el centro de atención fue de la siguiente manera: 54 casos que equivale al 87.1% fue visto en el Hospital Nacional de Jutiapa, de los cuales solo 45 (83.33%) tenían historia clínica, muchas veces con poca información; los restantes 8 casos fueron vistos en los centros de salud, los cuales no tenían historia clínica, y los cuales eran referidos inmediatamente por los directores de dichos centros al Hospital Nacional de Jutiapa, es de hacer notar que en muchos centros no se llevan adecuadamente los datos, y en muchos no aparecían los libros de registros de pacientes. (Cuadro 4)

La relación entre especie de ofidio y lugar de accidente muestra que la mayoría de los casos fue en plantaciones siendo un total de 27 casos (43.55%), seguido de los que se dieron en campo abierto. Por cascabel, de los 10 casos que se dieron 6 fueron en plantación y 4 en campo abierto. Se observan 4 casos de coral que se dieron en áreas despobladas. (campo abierto y plantación). En el caso de las especies desconocidas, se dieron con mayor frecuencia en áreas despobladas y áreas desconocidas. (Cuadro 5).

En la distribución de casos según las características del lugar del accidente y la actividad desarrollada al momento de ocurrir el mismo, muestra que la actividad en la cuál se encontraba la mayoría era trabajando (29 casos) de los cuales 27 eran en plantación, seguidas de las que fueron en campo abierto (16 casos); haciendo las actividades propias de la región antes mencionada. Es de hacer mención que en algunas fichas clínicas solo aparece la actividad ó la característica del lugar. (cuadro 6).

Según el área anatómica lesionada se vé que las manos fueron las más afectadas 15 casos (24.19%). De ellas, la mano derecha fue en 8 casos; debido a que la población las utiliza para la recolección de los cultivos, recolección de leña, búsqueda de animales y otras actividades. En los piés se dieron 13 casos (20.32%), debido ésto a que la población anda muchas veces descalza, o sin la adecuada protección. En el renglón desconocido se dieron 22 casos ya que en muchas fichas clínicas no se evidenció la región anatómica; también se dio el caso en el que se mencionó una serpiente que mordió en 3 sitios diferentes a un mismo paciente. (cuadro 7)

Las complicaciones más frecuentes que se dieron, fueron infecciones y hemorragias con 6 casos cada una; de las cuales, con infección solo 1 fue referido; en cambio con hemorragia 3 casos fue necesario de referirlos de los cuales no se encontro mayor información. Con necrosis se encontraron 2 casos. Se desconocen las complicaciones que pudieran haber tenido. (Cuadro 8).

En lo que respecta a complicaciones y secuelas del accidente ofídico, se encontró que los casos que tuvieron complicaciones y se refirieron, no se pudo saber si quedaron secuelas, de los casos que se dieron egresos en el Hospital Nacional en ninguno se menciona que hubiera quedado con algún problema. (Cuadro 9)

En lo que respecta a condición de egreso. 39 casos (63%), salieron como caso concluido, 17 casos más se desconoce por falta de ficha clínica. 6 fueron referidos a completar su tratamiento en un hospital de la Capital por falta de recursos. (Cuadro 10)

En el presente estudio 6 casos fueron de evolución mala, de los cuales 4 fueron producidos por cascabel y dos de ellos por ofidios desconocidos, y fueron referidos a hospitales de la Capital; 16 casos se desconoce su evolución por falta de información en la ficha clínica, el resto fue de evolución satisfactoria; se mencionan 4 casos de Coral, los cuales tuvieron evolución buena. (Cuadro 11)

Referente al horario en que los pacientes refieren haber sido atacados por un ofidio, fue mayor en horas de la tarde, pues se presentaron 16 casos (25.8%); en la gran mayoría de los casos se desconoce el horario del ataque, por falta de información en la ficha clínica (41.9%). (Cuadro 12)

IX.- CONCLUSIONES.

- 1.- El accidente ofídico es un problema real en Guatemala, principalmente en el área rural.
- 2.- Con respecto al accidente ofídico, el sexo que mayormente se vio afectado fue el masculino, y los grupos etáreos entre los rangos de 10 a 40 años.
- 3.- los agricultores en el sexo masculino, y los oficios domésticos en el sexo femenino, son los oficios o profesiones que con mayor frecuencia se ven expuestos al accidente ofídico.
- 4.- En la mayoría de los Centros de Salud y/o Puestos de Salud, no se cuenta con los recursos necesarios para tratar a los pacientes adecuadamente por lo que se ven obligados a referir a los pacientes a los hospitales de referencia como lo son el Hospital Nacional.
- 5.- La especie de ofidio que causo el mayor número de accidentes fue la reportada como "desconocida" con 47 casos, seguida de la Vibora de Cascabel (*Crotalos Durissus*) con 10 casos registrados.
- 6.- El área en donde mayormente ocurrieron las mordeduras de serpientes fue en caminos por ser el lugar en donde se moviliza la población agrícola (25 casos), seguido de finca con (17 casos) y desconocido (17 casos).
- 7.- la región anatómica mayormente afectada fue el reportado como desconocido (21 casos), seguido de mano derecha (9 casos) y en pie derecho con (8 casos).
- 8.- Las infecciones son las complicaciones que más afectan a la población de Jutiapa.
- 9.- En la mayoría de los centros asistenciales no se cuenta una hoja de registro en donde se lleve el control de los pacientes que consultan por mordedura de serpiente. En el Hospital Nacional de los 54 casos que se encontraron solo 45 tenían historia clínica y en los centros de salud ninguno tenía historia clínica.
- 10.- En la mayoría de los pacientes la condición de egreso fue satisfactoria, lo que evidencia un tratamiento aplicado a tiempo aunque no de una manera estandarizada.
- 1.- El tratamiento Etnomédico sigue teniendo gran aceptación dentro de la población del área rural, debido a la escasez del transporte y a la falta de recursos económicos de la población.

X .- RECOMENDACIONES

- 1.- Realizar actividades educacionales a la población y a nivel nacional sobre la prevención del accidente ofídico. (Educación afiches, etc.)
- 2.- Impartir cursos de capacitación al personal que labora en Centros y Puestos de Salud, acerca de las medidas preventivas y recursos a utilizar así como las medidas a tomar en caso de encontrarse ante una persona víctima del accidente ofídico.
- 3.- Cambiar y establecer las normas correctas de manejo del accidente ofídico a nivel hospitalario y seguir un protocolo establecido, como el que fue mencionado en el marco teórico.
- 4.- Preservar las especies depredadoras de serpientes venenosas como las aves de rapiña, el armadillo, la serpiente no venenosa Clelia Clelia (Zumbadora, zopilota).
- 5.- Mejorar las evoluciones médicas de las fichas clínicas para mejor comprensión del estado de los pacientes. (Utilizar el método de Weed).
- 6.- Con la ayuda de los diferentes sectores, implementar estudios de investigación que conlleven a desarrollar un suero antiofídico, que sea específico para las especies de serpientes existentes en el país y para que los mismos sean efectivos y estén al alcance económico de los pacientes.
- 7.- Desarrollar un mejor cuidado y manejo de las fichas clínicas por parte del personal de Registro Médico, para evitar extravío de las papeletas.
- 8.- Analizar y comprobar la eficacia del tratamiento con las plantas que se utilizan en la región para estos casos.

XI .- RESUMEN

El presente estudio fue realizado para investigar la incidencia de accidente ofídico en el departamento de Jutiapa, para lo cual se investigó en los registros clínicos de pacientes que consultaron del 1 de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1992. Para este fin se realizó una boleta de recolección de datos sobre accidente ofídico (ver anexo 1).

Realizando posteriormente los cuadros y gráficas correspondientes a cada una de las variables tomadas en consideración, encontrándose que el sexo más afectado es el masculino, y además que se encuentra entre los rangos de edad más productivas, la mayoría de ellos dijeron haber sido mordidos por especie desconocida y en segundo lugar por *Crotalus Durissus*.

Se encontró que el área anatómica más frecuentemente afectada son desconocidos, seguido luego de mano derecha y pie derecho, y que la gran mayoría de los pacientes tuvieron buena evolución, con excepción de casos quienes presentaron complicaciones leves (infección).

Del total de casos, se encontrarón casos de accidentes ofídicos en menores de 10 años y no se mencionan personas fallecidas.

En casi todos los centros de salud y hospital consultados se pudo observar, que estos no utilizan un adecuado método de registro lo que hace difícil obtener un control estadístico apropiado, además el personal médico y para-médico que realiza las historias clínicas no sigue adecuadamente el método de Weed, lo que hace casi imposible la comprensión de las mismas.

Las personas que practican la etno-medicina y que fueron consultadas en relación a mordedura de serpiente brindaron su colaboración y conocimiento el cual será muy útil para realizar éste estudio a nivel nacional.

XII - BIBLIOGRAFIA

- 1) Bolaños, Roger. Serpientes Venenosas y Ofidismo en Centro América. Ed. Universitaria de Costa Rica, Costa Rica, 1984, pp 15-78.
- 2) Bolaños, Roger. Epidemiología Clínica y Patológica de la Mordedura por Serpientes Venenosas en Centro América. Boletín Médico del IGSS (Guatemala), 1982, pp 4-38.
- 3) Bolaños, Roger. Las Serpientes Venenosas de Centro América y el Problema del Ofidismo (Recursos Terapéuticos). Rev. Cost. Cientif. Med. 1983, pp 17-26.
- 4) Bolaños, Roger. et al. Color Patterns and venom characteristics in pelamis platurus. Copeia, 1974. pp 909-912.
- 5) Bolaños, Roger. Serpientes Venenosas de Centro América: Distribución, características y patrones cariológicos. Mem. Inst. Butantan, 1983, pp 275-291.
- 6) Campbell, J. & Brodie, E. Biology of the Pit Vipers. Ed. Selva Tyler, Texas, 1992, pp 8-50, 159-170, 217-229.
- 7) Campbell, J.A. The biogeography of the cloud forest herpetofauna of Middle America, with special reference to the Sierra de las Minas of Guatemala. University of Kansas. Ann Arbor, Michigan, 1982. pp 44-56.
- 8) Campbell, J. & Lamar, W. The Venomous Reptiles of Latin America. Ed. Comstock Publishing Associates, a division of Cornell University, Press Ithaca and London, 1989, pp 6-326.
- 9) Cruz Moya, Carlos Fernández. Mordedura de Serpiente en el Hospital nacional de Cobán. A.V. Tesis (Médico y Cirujano). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas. Guatemala, 1979, pp 1-24.
- 10) Da Silva, O.A. et al. Intensive care unit treatment of acute renal failure following snake bite. Am. J. Trop. Med Hyg. 1979. pp 401-407.
- 11) Dirección General de Cartografía. Diccionario Geográfico de Guatemala. Tomo II. 1962, pp 46-49.
- 12) Dirección General de Servicios de Salud. Sistema Nacional de Salud y su Ubicación Geográfica. Tomo Unico. Guatemala 1991.

- 14) Harrison, et al. Principios de Medicina Interna. Undécima ed. México, Ed. Interamericana, 1987. pp 1017-1018.
- 15) Instituto Nacional de Estadística. Población Económicamente Activa (P.E.A.) por Rama de Actividad Económica, según Sexo y Grupo de Edad. IV Censo habitacional y poblacional. 1981, pp 50-54.
- 16) Kuylen Morales, Carlos. Diagnóstico y Tratamiento de Mordeduras de Serpiente. Tesis (Médico y Cirujano). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas. Guatemala, 1988, pp 20-45.
- 17) Morán Morales, Julia. Serpientes y Arácnidos más comunes de Guatemala. Tesis (Médico y Cirujano). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas. Guatemala, 1982, pp 8-16.
- 18) Palma S., Alvaro. Monografía de Jutiapa. 1959. pp 7-104.
- 19) Prado P., Eduardo. Comunidades de Guatemala.. 1985. pp 329-360.
- 20) Revista Tz'oluj-Ya. Número 1, Año 1, 1992. Guatemala.
- 21) Rivas Villatoro, Dora. Protocolo de Diagnóstico y Tratamiento de Accidente Ofídico en el Hospital Regional de Cobán, A.V. Tesis (Médico y Cirujano). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas. Guatemala. 1991, pp 11-68.
- 22) Rodríguez López, Mariano. Análisis sobre mordeduras de Serpiente en el Hospital del IGSS de Escuintla. Tesis (Médico y Cirujano). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas. Guatemala, 1982, pp 17-38.
- 23) Sabiston, D.C. Tratado de Patología Quirúrgica. 13a. ed. México, Ed. Interamericana, 1986. pp 299-301.

XIII.- ANEXOS

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC-
PROYECTO VENENOS DE OFIDIOS -DIGI-

REGISTRO SOBRE ACCIDENTE OFIDICO

Anotar datos del año 1987 a la fecha

DATOS GENERALES:

1. Nombre del Hospital: _____
2. Localidad : _____
3. Nombre del paciente : _____
4. No. de Registro Médico: _____ 5. Edad : _____
6. Sexo: 1) Masculino 2) Femenino _____
7. Profesión u oficio : _____
8. Domicilio: _____
9. Fecha del Accidente : Día _____ Mes _____ Año _____
10. Fecha de consulta : Día _____ Mes _____ Año _____
11. Fecha de ingreso : Día _____ Mes _____ Año _____
12. Fecha de Egreso : Día _____ Mes _____ Año _____
13. Lugar donde ocurrió el Accidente: _____
Finca _____ Aldea _____
Municipio _____ Departamento _____

En cada uno de los incisos, coloque el número de la opción seleccionada, en el espacio en blanco.

DATOS DEL ACCIDENTE:

14. CARACTERISTICAS DEL LUGAR: _____
1. Area poblada 2. Plantación 3. Bosque 4. Río
5. Campo abierto 6. Playa
15. ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: _____
1. Trabajo 2. Paseo 3. Otro. Especifique _____
16. AREA ANATOMICA LESIONADA: _____
1. pié derecho 2. pié izquierdo 3. pierna derecha
4. pierna izquierda 5. Muslo 6. Gluteo 7. mano derecha
8. mano izquierda 9. Antebrazo derecho 10. Antebrazo izquierdo 11. brazo 12. cuello 13. cabeza 14. otro _____
17. ESPECIE DE OFIDIO QUE OCASIONO EL ACCIDENTE
1. Barbamárrilla 2. cascabel 3. cantil 4. coral
5. Gushnayera 6. desconocido 7. otro.
Especifique: _____
18. EVOLUCION DEL CASO _____
1. Buena 2. Mala
19. COMPLICACIONES: _____
1. ninguna 2. infección 3. necrosis 4. shock
5. parálisis 6. hemorragia 7. otra Especifique _____
20. SECUELAS: _____
1. ninguna 2. limitación de movimiento 3. limitación de función
4. pérdida de substancia 5. amputación
6. lesión neurológica 7. otra ESPECIFIQUE _____
21. CONDICION DE EGRESO: _____
1. caso concluído 2. pendiente cirugía 3. cita fisioterapia
4. Muerto 5. Otro Especifique _____
22. OBSERVACIONES _____

Favor hacer llegar esta información a:
Dr. Carlos Escobedo Pacheco.
Facultad de Medicina
Ciudad Universitaria, zona 12

ANEXO # 2

PROTOCOLO DE MANEJO

- 1.- Evaluar el caso a su ingreso a emergencia para clasificarlo de acuerdo a su severidad. (Grados de envenenamiento).
- 2.- Ingresar al paciente a Intensivo.
- 3.- Colocar al paciente en reposo absoluto en cama.
- 4.- Indicar nada por vía oral o dieta líquida dependiendo de su estado hasta nueva orden.
- 5.- Controlar signos vitales completos cada hora en las primeras 4 horas y cada dos horas posteriormente.
- 6.- Vigilar por: Dolor, fiebre, edema, hipotensión, hemorragia, hematuria, melena, taquicardia, bradicardia, disnea, náusea, cefalea, convulsiones, flictenas, necrosis, fasciculaciones y parálisis, dependiendo de la severidad del caso.
- 7.- Realizar los siguientes laboratorios: Hematología Completa, Orina, Heces, Fibrinógeno, Tiempo de Protrombina, Tiempo Parcial de Tromboplastina, Tiempo de Sangría, Plaquetas, Nitrógeno de Urea y Creatinina en sangre; y de ser posible CPK (Creatín Fosfoquinasa) cada 4 a 6 horas.
- 8.- Si el paciente es asintomático, únicamente se ingresa y observa vigilando por edema y dolor siempre con reposo absoluto y observación estricta.
- 9.- Clasificar el grado de envenenamiento de acuerdo a la sintomatología y hallazgos de laboratorio.
- 10.- Se puede inyectar 5 viales en todos los casos repitiendo cada dos horas en los muy graves, cada cuatro horas en los moderados y cada seis horas en los demás casos. Se recomienda no administrar más de treinta viales en 24 horas. El Suero Anti-ofídico se interrumpe al corregirse el sangrado. Coagulación y Plaquetas se van a normalizar tardíamente.

El suero antiofídico debe ser aplicado ÚNICAMENTE por vía IV dentro del hospital pero con un ritmo que no sobrepase los 2 ml. por minuto para minimizar las reacciones secundarias. Para su aplicación se empleará, diluyendo un vial de 10 ml. en 500 ml. de solución salina o glucosada

(1:50), lo cual evidenciará si existe hipersensibilidad. De ser bien tolerado, se incorporarán el resto de los frascos necesarios, siempre a goteo lento por 15 minutos, en la solución de 1:5 ó 1:10 posteriormente a esto se reiniciará la administración en forma más rápida, de acuerdo al estado del paciente.


Si se presenta alergia, se reconsiderará la necesidad del suero; y si realmente es necesario se debe mantener una solución más diluida a goteo lento; Se deben administrar antihistamínicos IV (Clorferinamina 2 a 4 mg c/6 horas lentamente aplicado). Además debe tenerse a mano una solución de adrenalina 1:1000 y equipo de resucitación cardiopulmonar. Si los antihistamínicos fallan, se asocian Corticosteroides IV (Hidrocortizone 100 a 250mg. c/6 horas), estos sólo en reacciones a suero tardías.

- Debe aplicarse tratamiento antitetánico preventivo. (Toxoide tetánico a ATT).
 - Administrar analgésicos para contrarrestar el dolor. (Aspirina no).
 - Administrar antibióticos como Metronidazol, en todos los casos, y otros antibióticos si existe sepsis evidente con cultivos positivos.
- 11.- Soluciones: Debe canalizarse una vía e introducir soluciones salinas o Dextrosadas para la administración de medicamentos y el suero antifídico.
 - 12.- Especiales: Evaluar al paciente cada 4 horas para saber si progresa o si es necesario aplicar más viales de antiveneno; lo cual será evidente luego de la evaluación y valoración en cuanto a sangrado, progreso del edema, alteración de los factores de la coagulación, condición renal, etc.
 - 13.- Colocar sonda vesical para el control estricto de orina en casos moderados, severos y críticos.
 - 14.- Medir el edema cada dos horas, tomando como mínimo 2 puntos de referencia.
 - 15.- Evaluar transfusiones sanguíneas o de plasma en caso de hipovolemia.


En los casos de envenamiento por coral, el número de viales anti-coral a utilizar es menor.

- 16.- Mantenga lista solución de Adrenalina 1:1000 y equipo de resucitación cardiopulmonar, cerca del paciente.


ANEXO 3
SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.










Serpiente con foseta



Serpiente sin foseta



MARCAS DEJADAS POR LA MORDIDA DE SERPIENTES.

	INOFENSIVA		VENENOSA	
Mordidas con todos los dientes	 <p>(Mandíbula superior)</p>	 <p>(Mandíbula inferior)</p>	 <p>(Mandíbula superior)</p>	
Mordidas con algunos dientes	 <p>(Mandíbula superior)</p>	 <p>(Mandíbula inferior)</p>	 <p>(Mandíbula superior)</p>	 <p>(Mandíbula superior)</p>



Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social
CENTRO DE SALUD
MOYUTA, JUTIAPA
Tel. 0447123

NUM. _____
REF. _____


Al contestar sírvase mencionar el
Número de Referencia de esta
Nota.

Moyuta, 24 de febrero de 1,994.

Doctor
Carlos Escobedo
Asesor de Tesis
Universidad de San Carlos
Guatemala.

Atentamente por este medio nos permitimos informarle que por la posición geográfica del Centro de Salud de Moyuta, Jutiapa, y por la descripción del mismo que abarca 3 municipios y un sólo médico, con una extensión territorial de 856 kms.², y una población de 80,000 habitantes, según el INE, no tenemos a la fecha conocimiento ni aparece en nuestras fichas clínicas donde se reporte ningún tipo de mordeduras de ningún Ofidio (serpientes en general). Además debo advertir que en éste Centro de Salud ni en los Puestos de salud que conforman el Distrito de Salud, en su totalidad son nueve Puestos de Salud; no existe ningún medicamento para atender este tipo de accidentes provocados por reptiles, por lo que es obvio que los pacientes no acuden al tratamiento respectivo.

Tengo entendido que la única institución que da este tratamiento es el I.G.S.S. a sus afiliados a nivel departamental, esto lo tengo por referencia de los mismos pacientes afectados.


Dr. Jorge Chea González
Director Centro de Salud
y Jefe de Distrito de Salud
Moyuta, Jutiapa.



Jutiapa, 2 de Marzo de 1994


Doctor:

Carlos Escobedo

asesor de Tesis

Por medio de la presente se hace constar que el Dr. Luis Arnaldo Sanchez se presentó a este Hospital a revisar la fichas clinicas de todos los pacientes que sufrieron mordeduras x serpientes durante los años del 1 de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1992, encontrandose unicamente 54 casos de los cuales solo se encontraron 45 historias clinicas.

sin otro particular atentamente.



Odir Ramirez Ruiz
JEFE DE ESTADISTICA Y REGISTROS
MEDICOS

