


**"DETERMINACION DEL ANCHO Y LARGO DE LOS SEIS DIENTES
ANTERIORES SUPERIORES EN INDIVIDUOS DE 15 AÑOS DE EDAD
EN
ADELANTE".**

TESIS PRESENTADA POR:


MARIA DEL CARMEN PACHECO CASTAÑEDA DE RIVAS



**Ante el tribunal de la Facultad de Odontología de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, que practicó el Examen General Público previo a
optar al título de:**

CIRUJANO DENTISTA

Guatemala, abril de 1997



DEDICO ESTE ACTO

A DIOS NUESTRO SEÑOR

A MIS PADRES:

JOSE JACINTO PACHECO GRAMAJO

CARMEN ADILIA CASTAÑEDA DE PACHECO

A MIS HERMANOS:

JOSE FRANCISCO, PATRICIA ISABEL, LUIS

ARTURO, ESTUARDO ENRIQUE

A MI ESPOSO:

ERICK STUARDO RIVAS CHAVEZ

A MI HIJA:

MARIA DEL CARMEN RIVAS PACHECO

A MI TIA:

MATILDE ALCIRA CASTAÑEDA MALDONADO

A MIS SUEGROS:

JORGE RIVAS LOPEZ

BERTHA ANGELINA CHAVEZ DE RIVAS

TESIS QUE DEDICO

A MI PATRIA GUATEMALA

A QUETZALTENANGO

A LA ESCUELA NACIONAL "Dr. ROBERTO MOLINA"

AL COLEGIO EVANGELICO "LA PATRIA"

A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

A LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

A MIS CATEDRATICOS E INSTRUCTORES

A MIS COMPAÑEROS

A MI AMIGA

MAYLEEN ESPINOZA RODRIGUEZ

HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

Tengo el honor de someter a vuestra consideración mi trabajo de tesis titulado "DETERMINACION DEL ANCHO Y LARGO DE LOS SEIS DIENTES ANTERIORES SUPERIORES EN INDIVIDUOS DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE", conforme lo demandan los reglamentos de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos, previo a optar al título de:

CIRUJANO DENTISTA

Quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Jorge Luis Villatoro López por su valiosa colaboración en la realización de este trabajo de tesis.

Y a ustedes distinguidos miembros del tribunal examinador, reciban mis más altas muestras de consideración y respeto

INDICE

	<i>página</i>
Sumario	1
I.- MARCO CONCEPTUAL	
A.- Introduccion	2
B.- planteamiento del problema	3
C.- Justificación	4
Í.I.- MARCO TEORICO	
A.- Los dientes artificiales y su selección	5
A.1.- Estética	5
A.2.- Elementos de la estética dental	5
A.3.- Utilizacion de normas y patrones	9
A.4.- Dientes estéticos funcionales	10
B.- Nomenclatura de los dientes artificiales.	10
C.- Influencia de los dientes artificiales en las estructuras protéticas	11
C.1.- Tecnología fabril de los dientes anteriores	12
C.2.- Comparacion de dientes de acrílico y de porcelana	13
D.- Seleccion de dientes anteriores	14
D.1.- La calidad	15
D.2.- Forma y contorno	15
D.3.- Tamaño	16
E.- Técnica de la relación biométrica	18
F.- Ancho de los dientes	19
G.- Técnica del espacio disponible	20
H.- Algunos de los criterios adicionales para seleccionar los dientes anteriores	20
H.1.- Tamaño	20

H.2.- Raza	21
H.3.- Edad	21
H.4.- Sexo	21
H.5.- Labios	22
I.- Dispositivos utilizados por los artistas	22
I.1.- Punto de observación	23
I.2.- Equilibrio	23
I.3.- Perspectiva	24
I.4.- Proporción	25
J.- Aspectos antropológicos	25
J.1.- Método No. 1	26
J.2.- Método No. 2	27
III.- MARCO METODOLOGICO	
A.- Objetivos	30
B.- Variables, su definición e indicadores	31
C.- Criterios de inclusión	33
D.- Instrumentos	34
E.- Procedimiento	35
IV.- MARCO OPERATIVO:	
A.- Recursos que se requieren	38
B.- Presentación y análisis de resultados	40
C.- Conclusiones	71
D.- Recomendaciones	73
E.- Limitaciones	74

V.- ANEXOS

A.- Anexo 1

75

B.- Anexo 2

76

BIBLIOGRAFIA

78

SUMARIO

El presente estudio, se realizó con la finalidad de establecer las longitudes cérvico-incisales de las piezas anteriores superiores, asimismo, longitud de arco de las mismas, lo cual permitió conocer las dimensiones de dichas piezas dentales de la población guatemalteca. Esta investigación se limitó a analizar las longitudes dentales de la población de la cabecera departamental de Quetzaltenango, a partir de una muestra de ciento cuarenta pacientes, todos ellos estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de Occidente Sección Diurna ubicado en la cabecera departamental de Quetzaltenango, Guatemala, en edad de quince años en adelante.

Como resultado de la investigación, se encontró que las dimensiones dentales clínicamente establecidas, para el largo cérvico-incisal de las piezas anteriores superiores muestran frecuencias que oscilan entre 7 mm a 11 mm; y, para la longitud del arco de distal de pieza seis a distal de pieza once, la frecuencia oscila entre 47 a 63 mm.

En virtud del resultado de este estudio, se ha considerado conveniente elaborar una guía de tamaños de dientes que contengan las dimensiones más frecuentes de este grupo de dientes.

Luego de determinar por medio del trabajo de campo y de haber registrado las dimensiones clínicamente, se procedió al análisis estadístico de las mismas y se establecieron diferencias diversas entre el presente estudio y los resultados reportados por otros autores. (1).

I.- MARCO CONCEPTUAL

A.- INTRODUCCION

Esta investigación, pretendió evaluar, el ancho y largo de los seis dientes anteriores superiores, longitudes que fueron establecidas en la corona "anatómica" de dichas piezas. El ancho se midió de distal de la pieza seis a distal de la pieza once siguiendo la curvatura natural del arco dentario y, el largo, se midió de cervical a incisal en el tercio medio siguiendo el eje largo de las piezas ocho y once.

Este trabajo se realizó en individuos de quince años de edad en adelante, de ambos sexos, en la cabecera departamental de Quetzaltenango.

Con los resultados obtenidos de esta evaluación se pudo obtener una guía real del tamaño de los seis dientes anteriores superiores de la población estudiada. Esta información sirve como referencia para la selección de dientes artificiales para prótesis totales.

C.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no se tienen procedimientos o técnicas propias para la selección del tamaño de los dientes artificiales que se utilizan para elaborar prótesis totales. Por lo tanto, los procedimientos que se aplican para seleccionar los dientes, se basan en estudios realizados en el extranjero, los cuales se fundamentan en dimensiones dentales que en todos los casos no corresponden a la población guatemalteca.

Este estudio se realizó en estudiantes que tienen clínicamente una dentadura alineada, sin restauraciones, y sin apariencia de enfermedad periodontal; todos ellos estudiantes del nivel medio de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de Occidente Sección Diurna, de la cabecera departamental de Quetzaltenango.

B.- JUSTIFICACION

En la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se recomiendan diversos procedimientos técnicos para seleccionar el tamaño de los dientes artificiales que se utilizarán para elaborar prótesis totales. Estos procedimientos técnicos se fundamentan en estudios realizados en el extranjero.

En virtud de lo anterior se estima conveniente efectuar un estudio del tamaño de los dientes anteriores superiores naturales del guatemalteco, para tener referencia real de las dimensiones del mencionado grupo de dientes.

Actualmente se seleccionan los dientes anteriores superiores artificiales, con métodos que posiblemente indiquen tamaños de dientes no acorde al desarrollo craneo-facial del guatemalteco.

Además, conociendo mejor las medidas naturales de los dientes del guatemalteco, se podrá seleccionar con mayor certeza el tamaño de los dientes que se emplearán para elaborar las prótesis totales.

Se tomó como grupo de estudio, individuos de ambos sexos en edad de quince años en adelante, estimando que esta es la edad promedio en la cual el ser humano ha completado su desarrollo craneo-facial.

II.- MARCO TEORICO

Revisión de Literatura:

A.- LOS DIENTES ARTIFICIALES Y SU SELECCION:

A.1.- ESTETICA: *El manejo de la estética en prótesis varía desde las estrechas consideraciones de duplicación de los dientes naturales en su color y forma, al más amplio y extenso campo de aspecto social y psicológico. La palabra estética se define generalmente en término que comprenden diversos campos del pensamiento organizado: Por ejemplo, en filosofía, la estética se define como: "la ciencia que deduce de la naturaleza las reglas y principios del arte y la belleza"; en psicología se define como: "el estudio de la mente y de las emociones en relación con el sentido de la belleza". (5).*

Así pues, el término estética comprende no solo los principios del arte, los cuales están relacionados en el más estricto sentido con los conceptos básicos de línea, forma, color, ritmo, armonía y movimiento, sino además con el más amplio nivel cultural, tal como está señalado en las distintas expresiones de cultura. (3).

A.2.- ELEMENTOS DE LA ESTETICA DENTAL: *En lo que se refiere al aparato dentario, nuestra civilización aprecia como elementos de belleza los que expresan salud, armonía y pureza (o limpieza). (5).*

Aquellas clásicamente consideradas expresiones destacadas de belleza dental, como la blancura, la pequeñez o lo parejo, en lo que a prótesis se refiere, han dejado de figurar como métras. (5).

Los anteriores conceptos incorporados a las dentaduras protésicas, constituyen más bien notas falsas, se aspira a la armonía y equilibrio de las restauraciones dentro del ser humano. Como dijera R. J. Nagle hace muchos años: "el mejor aparato de prótesis es el que no se distingue". (5).

En el conjunto de elementos que contribuyen a los conceptos de belleza dental, es conveniente apreciar aquellos que pueden resolverse por separado. Por ejemplo: el color de los dientes y encías artificiales; su tamaño, su alineamiento; para formar los arcos dentarios, su articulación con los antagonistas, la posición de los arcos y gíngivas artificiales en relación con las estructuras bucales, en especial los labios, carrillos y la lengua, la disposición de cada diente y de la zona gingival que le corresponde. (5).

Por lo consiguiente, para una estética satisfactoria, son pertinentes las siguientes consideraciones:

1- Forma de los dientes

2- Color

3- Tamaño

4- Material de que están construidas

5- Inclinación axial y rotación de los dientes

6- Forma de la arcada

7- Plano oclusal

a) plano incisal

b) plano posterior

8- Caracter del material de que está construida la base de la prótesis.

9- Color del acrílico de la base

10- Relaciones maxilo-mandibulares

a) retruidas

b) normales

c) protruidas

11- Dimensión vertical

12- Relación céntrica

13- Espacio o abertura interoclusal

14- Actividad funcional

a) fonación

b) Respiración

c) Masticación

15- Consideraciones sociales y psicológicas.

16- Comodidad del paciente (3).

El color y contorno de los dientes únicamente son dos factores dentro de la secuencia anterior. Se recomienda que los colores sean variados y que representen los tintes más oscuros encontrados en los dientes naturales, que los contornos sean irregulares y que los moldes suministrados por los fabricantes sean surtidos.

La posición de los dientes en la arcada y las relaciones que guardan entre ambas arcadas son también factores importantes. (3).

También se recomienda que la posición individual de los dientes en la arcada sea variada, para representar las más amplias características individuales que podemos encontrar en la disposición natural de los dientes. (3, 4).

El montaje de los dientes nos proporciona solo una indicación parcial de lo que estos dientes parecerán más tarde en la boca; por esto, el verdadero test en cuanto a la estética necesitamos hacerlo sobre una base funcional. (3).

Los dientes deben apreciarse en la boca del paciente su tamaño, forma, color y disposición, asimismo deberán examinarse y relacionarse con los movimientos activos de los labios.

La posición de los dientes debe ser adecuada a la acción muscular, de modo que la deglución, espectoración, pronunciación, risa y sonrisa, así como la posición de reposo y, en los distintos actos en los cuales participan los músculos, deben estar en armonía con la posición de los dientes. (3).

Es importante tener presente que para obtener los resultados anteriormente mencionados no debe olvidarse la relación proporcional de los dientes anteriores inferiores con respecto al tamaño de los dientes anterosuperiores que forman parte del conjunto de los aspectos anteriormente mencionados. (12).

Por esto es muy importante que cuando se hace la prueba en cera, cuando el paciente lleva la dentadura en la boca, se encuentre relajado, que se levante de la silla y que camine, que beba líquidos, que hable y que practique distintas actividades que expresen animación. (3).

Las consideraciones psicológicas en cuanto a la estética son de extrema importancia y por esto debemos informarnos de la actitud del paciente en relación con la restauración protésica, completando sus deseos en la medida de lo posible. (3).

A.3.- UTILIZACION DE NORMAS Y PATRONES: Cada persona dispone de un sentido artístico más o menos nato en el cual puede desarrollarse y guiarse por normas. (1, 11).

Aunque las artes más finas, como son la arquitectura, pintura y escultura, no están sujetas a reglas tan estrictas como las que rigen la física y las matemáticas, sin embargo, se acogen a una serie de principios de los cuales pueden ser formuladas reglas válidas; no se ha logrado nunca una obra maestra de arte sin una subordinación a esos principios sobre los que están basados estas normas. (3).

Para lograr una prótesis satisfactoria y de aspecto natural, a la cual tiene derecho el paciente, es necesario adquirir los suficientes conocimientos sobre los principios de estética, para aplicarlos después a la construcción de la dentadura artificial. (3).

A.4.- DIENTES ESTETICOS FUNCIONALES: Aunque todos los dientes, tanto naturales como artificiales contribuyen a la vez a la estética y a la función, ayuda a encontrar soluciones, la antigua norma clínica de considerar a los dientes del sector anterior como esencialmente estéticos y a los posteriores como esencialmente funcionales. (5).

Esto permite el esfuerzo clínico en uno u otro sector, de acuerdo con el estado de las estructuras remanentes. Cuando las circunstancias no son favorables, se puede, aún se debe, eliminar las posibles funciones de prehensión, desgarramiento y corte que corresponden a los incisivos y caninos, señalando al paciente las razones de tal limitación. Casi siempre lo acepta sin inconveniente al comprender que ello permite mejor resultado estético, la función aparece excesivamente comprometida, la salud del paciente es el factor decisivo para el juicio del odontólogo aún en contra de la opinión del propio paciente. Este con frecuencia prefiere comprometer la salud de sus maxilares y su propio porvenir protésico con tal de lograr un trato por un ciento más de estética. (5).

B.- NOMECLATURA DE LOS DIENTES ARTIFICIALES En general el nombre de los dientes y sus partes constitutivas son las mismas que en los dientes naturales: corona, cuello, caras, borde incisal, cúspides y surcos. Hay sin embargo, una nomenclatura esencial para aquellas partes que no existen en los dientes naturales. (5).

El talón es la parte del diente artificial que, en su superficie palatina o lingual, separa a ésta de los elementos de retención. A los dientes anteriores carentes de

talón, destinados generalmente a trabajos metálicos se les denominaba dientes planos. (5).

Las espigas son el elemento característico de los "dientes con espiga", generalmente delanteros: los dientes de espigas lisas se emplean habitualmente en prótesis metálicas. En prótesis total se utilizan casi exclusivamente espigas con cabeza, que se anclan en el material plástico de la base. (5).

C.- INFLUENCIA DE LOS DIENTES ARTIFICIALES EN LAS ESTRUCTURAS PROTESICAS: *En la actualidad no parece necesario entretenerse en el estudio de las variedades de dientes artificiales que enriquecían la literatura prostodóntica. La incorporación de los dientes de acrílico ha permitido hallar soluciones prácticas y exentas de complicaciones técnicas para una cantidad de los problemas que plantean los casos particulares. (5).*

Los dientes de acrílico, aunque no sea muy clara la información respecto a los materiales que los integran, parece evidente que la resina acrílica polimetacrilato de metilo sigue siendo perfecta. (5).

Relativamente fáciles de producir en el taller (o aún en el consultorio), lo que los hace inapreciables en ciertas circunstancias, la fabricación industrial es también relativamente sencilla, sea en moldes metálicos o de yeso piedra, ya que la resina acrílica no requiere gran precisión para moldearla ni gran temperatura para polimerizar. (5).

Por otra parte, destinados a integrar bases también de resina acrílica, no requieren previsión especial para la retención. Se les hace casi siempre macizos. Es fácil hacerles retenciones mecánicas con fresas, si se requiere. También es fácil lograr su unión química, cuando son de resina acrílica, a la base de la misma calidad. (5).

C.1.- TECNOLOGIA FABRIL DE LOS DIENTES ANTERIORES: *Un problema permanente de los fabricantes es la determinación de las formas y tamaños convenientes para los dientes artificiales. En la época de los dientes humanos, el dentista debía conformarse con lo que se consiguiera del sepulturero o de los depredadores nocturnos de los campos de batalla. En las primeras épocas de los dientes de porcelana se procuró hacer dentaduras de una pieza; luego se independizó a los dientes individuales; más adelante, como señala Rothero (1,928), se ensayó la construcción de juegos, de acuerdo con los requerimientos de cada caso. Solo a partir de de 1,830 más o menos se comprendió que la fabricación masiva exigía una limitación de formas. Esto se hizo con bastante arbitrariedad, encargándose a expertos el tallado de "formas ideales", un quinto mayores de lo requeridos, para compensar la retención cerámica. Varios tamaños permitirían elegir y combinar lo conveniente en cada caso. (5).*

Hall (1,887) sugirió clasificar las formas, para preparar los dientes artificiales, en cuatro grupos, un tanto similares a los propuestos posteriormente por Williams

(1,911), quien sugirió la clasificación en triangulares, cuadrados, ovoides y mixtos, surgida de los dientes naturales.

Es la clasificación que, con algunas variantes, se mantiene hasta la actualidad.

(5).

Los dientes de la dentist's Supply Co. (Trubyte y derivados) reproducen todavía los tallados hechos por Williams. (5).

Dentro de cada forma, se fabrican diversos tamaños, que varían en el ancho y el largo. Se pueden elegir individualmente, por pares y en grupos de seis. Los catálogos de las fábricas traen indicados los tamaños, para facilitar la selección.

(5).

Gracias a estas combinaciones, el odontólogo puede elegir los dientes por juegos combinar los que, a su juicio, sean más adecuados para cada caso, sin que ello traiga complicaciones al vendedor. Pero este debe mantener un Stock de cierto surtido, porque la variedad de formas y tamaños debe multiplicarse por la variedad de colores, y eventualmente, la de fabricantes. (5).

C.2.- COMPARACION ENTRE DIENTES DE ACRILICO Y DE PORCELANA:

Respecto a su dureza los dientes de acrílico son de menor resistencia que los de porcelana; en relación al color, los dientes de acrílico tienen mayor susceptibilidad de modificar el mismo en comparación a los dientes de porcelana. Los dientes de porcelana son fácilmente fracturables mientras, que los dientes de acrílico poseen

mayor elasticidad.

La condición anatómica de los dientes de porcelana o acrílico es similar en belleza pero, la mayor ventaja entre los dientes de acrílico y de porcelana es que estos últimos producen el desagradable ruido de choque "chasquido" durante los movimientos de masticación. Es pertinente aclarar que los dientes de acrílico absorben el mencionado "ruido".

Respecto a la eficiencia masticatoria en el estudio que realizó Schultz (1,951) demostró que los dientes de porcelana tienen mayor eficacia en un 67% respecto a los dientes de acrílico. (5).

En otras palabras y, resumiendo una experiencia clínica, en casi treinta años: los dientes de acrílico no son rivales de los de porcelana, sino un eficaz complemento, los reemplaza con ventaja en aquellos casos donde los cerámicos plantean problemas. (5).

D.- SELECCION DE DIENTES ANTERIORES: *Cuando los dientes artificiales son arreglados, debemos considerar que la boca del paciente debe ser restaurado a los mismos contornos faciales que tenía antes de perder sus dientes naturales.*

Resumiendo la selección de dientes: Se realiza de una manera diferente para pacientes con historia dental conocida (registros de pre-extracción, fotografías, etc.) y para los que en el momento están edéntulos (forma del reborde residual, espacio disponible, etc.)

D.1.- LA CALIDAD DE LOS DIENTES ARTIFICIALES: Podría decirse que calidad, la mejor es el lema que preside la evolución general de la odontología. Supeditado siempre el concepto realista, sin el cual no podría ayudar a la humanidad sufriente: "Calidad, la mejor dentro de las posibilidades". (5).

La primera decisión de calidad respecto a los dientes artificiales está entre los plásticos y los cerámicos, cuyas características se han mencionado. (5).

En términos generales, los dientes plásticos están indicados:

- 1- Para trabajos de gran urgencia, por su menor exigencia tecnológica,
- 2- Cuando los antagonistas son dientes naturales o de acrílico o puentes metálicos,
- 3- para eliminar la capacidad abrasiva de los dientes cerámicos,
- 4- En los maxilares débiles o sensibles, cuando se busca la mayor comodidad,
- 5- Cuando las condiciones del paciente no permiten exactos registros intermaxilares,
- 6- Cuando el espacio protésico impide lograr con los dientes de porcelana prótesis
- 7- de estructura sólida,
- 8- En sujetos que rompen los dientes de porcelana. (5).

D.2.- FORMA Y CONTORNO DE LOS DIENTES ARTIFICIALES: La cara es el punto de mayor atención para la gente. Refleja los sentimientos de las personas y el medio ambiente. Williams, observó que existe una relación directa entre el contorno del diente central superior y el contorno de la cara de una persona y reconoció cuatro formas: cuadrada, cuadrada triangular, ovoidea y triangular. (1).

En la forma de los dientes artificiales deben distinguirse dos aspectos esencialmente distintos: Estético y Funcional. (5).

Relativo al aspecto estético deberá tener una relación directa con el contorno facial que se determina (según Williams), por medio de las regiones anatómicas: Para el CUADRADO; ancho de la frente, arco cigomático y ángulo mandibular, formando ángulos rectos entre las líneas de unión de dichas regiones. Para la forma OVOIDE el ancho del arco cigomático es mayor que la distancia de la frente y el ángulo mandibular; para la forma TRIANGULAR el ancho se hace más angosto desde la frente hacia el arco cigomático y el ángulo mandibular y para la forma CUADRADO TRIANGULAR se hace una combinación de las tres formas anteriores. (2).

Finalmente la forma de los dientes anteriores podrá ser modificada ligeramente para adecuarla a ciertos casos especiales, cuando la estética del paciente lo demande. (1).

D.3.- TAMAÑO: *La apropiada proporción del tamaño de los dientes con respecto al tamaño de la cara, es de suma importancia para la estética. (1).*

El tamaño de los dientes anteriores se selecciona en relación al incisivo central superior (diametrología odontológica), de manera que escogiendo el tamaño correcto de este, todos los demás corresponderán también. (1).

Además, la construcción de una base de registro con su respectivo rodete,

colocados en boca proporcionará una guía para seleccionar por medio de la sonrisa, el largo apropiado del incisivo central y del canino. (5).

Otra referencia posible, es el ancho de la base nasal, que coincide, según Kern con la de los cuatro incisivos en más del 90% de los casos. Otro concepto es que el 60% del ancho de los seis dientes anteriores, coincida con la cúspide de los caninos. La "línea del canino" señala la posición del vértice del canino en el 80% de los casos. La medida entre las líneas de los caninos debe tomarse con una regla milimetrada flexible aplicada sobre la superficie anterior del rodete de articulación. (5).

En los pacientes de boca grande y movedisa, puede ser prudente colocar los dientes algo más anchos. En las mujeres se puede añadir un toque de femeneidad si se eligen incisivos laterales relativamente angostos.

El tamaño de los anteriores inferiores surge del de los superiores. Puede determinarse a simple vista o eligiendo los tamaños en milímetros según los catálogos de las fábricas. (5).

Estas medidas son relativas y el clínico debe desarrollar el ojo y criterio acertados, examinando los dientes directamente en su aplicación en la boca, su efecto, su relación con los antagonistas (y poniéndose de acuerdo con el paciente). (5).

El espacio disponible sea para la prótesis superior o inferior, es otro elemento de

juicio que puede influir en la selección del tamaño y la forma de los dientes. (5).

Varias técnicas se han preconizado para seleccionar el tamaño de los dientes artificiales,. Mencionaremos algunas de estas técnicas usadas en la facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. (1).

E.- TECNICA DE LA RELACION BIOMETRICA: *Para que el tamaño de los dientes sea armónico y agradable, además de funcional, debe de ser proporcional a las características étnicas y morfológicas de la cara del paciente. Estudios antropométricos hechos en los Estados Unidos indican que la relación promedio entre en el tamaño de la cara y el incisivo central superior es de 16 a 1 tanto en el sentido gingivoincisoral como el sentido mesiodistal, es decir el ancho y largo del incisivo central superior corresponde a 1/16 del ancho y largo de la cara. Esta es la relación biométrica. (1).*

La técnica de medir la cara del paciente y dividir las medidas entre 16 para obtener el tamaño del incisivo central se ha descartado debido a que las características antropológicas de la población guatemalteca no corresponden a las estudiadas en los Estados Unidos, ya que en nuestro medio los procesos alveolares son más desarrollados y las coronas clínicas son menores en sentido gingivo-incisoral, comparada con las muestras estudiadas en los Estados Unidos. (1).

Esto nos da espacio para dentaduras mucho menores, donde no caben, generalmente, los dientes seleccionados por la técnica de la relación biométrica 1/16. De acuerdo con los estudios realizados por el Dr. J. L. Villatoro (tesis de

graduación No. 1,982) se comprobó que la relación biométrica para el guatemalteco, de acuerdo con el largo cervico-incisal de los dientes anteriores superiores, es de 17 y de 18 en el 44% de las muestras estudiadas, lo que establece que los incisivos del guatemalteco son más pequeños cervico-incisalmente que los norteamericanos. En cuanto al ancho mesio-distal se encontró que la relación biométrica del guatemalteco es de 15 y 16 en el 56%, lo que comprueba que los incisivos son iguales o ligeramente más anchos que los norteamericanos. (1).

Por tanto, si se toman en cuenta estas diferencias, puede usarse perfectamente el sector de dientes de la casa Trubyte, siempre que se haga la corrección correspondiente. (1).

F.- ANCHO DE LOS DIENTES: *El ancho se obtiene midiendo el espacio correspondiente a los seis dientes anteriores. (1).*

Instalada la base de registro con su respectivo rodete, adecuadamente recortado, para seleccionar la medida, se marca en el mismo la posición de la cúspide de los caninos. Para esto se puede utilizar el siguiente método: se coloca una regla plástica de manera que pase por el ángulo interno del ojo después, por el ala externa de la nariz y llega hasta el rodete donde se hace la marca que corresponde a la cúspide del canino. (1).

Se mide de una a otra marca con una regla flexible, siguiendo la curvatura del rodete, se obtendrá la distancia entre las cúspides de los caninos. A esa longitud, se

le agrega 5 mm para obtener la distancia de la cara distal de un canino a la de otro. Con esa medida se define el juego de dientes que más se aproxime a la longitud deseada. (1).

G.-TECNICA DEL ESPACIO DISPONIBLE: *Esta es la técnica que se utiliza en la Facultad de Odontología, la cual consiste en: con los rodetes puestos en el articulador, relacionados en oclusión céntrica, se desmonta el superior y se cierra el articulador; se mide el espacio vertical disponible entre el vértice del reborde residual superior y la superficie oclusal del rodete inferior a nivel de la línea media; con este procedimiento se obtiene el largo del incisivo central superior. (1).*

El ancho de los seis dientes anteriores superiores se determina midiendo la distancia que existe entre las constantes anatómicas papila incisiva y tuberosidades; al promedio de esas longitudes se le suman 5 mm para compensar el tercio distal de los caninos; este procedimiento antropológico determina el ancho de los seis dientes anteriores superiores. (1).

Debido a la disminución natural del tamaño de la boca, por la reabsorción fisiológica normal, de los rebordes residuales, es aceptable seleccionar entre los moldes disponibles el inmediato inferior al molde exacto. (1).

H.- ALGUNOS CRITERIOS ADICIONALES PARA SELECCIONAR LOS DIENTES ANTERIORES:

H.1.- TAMAÑO: *En las pruebas de belleza de los dientes, se procura hacer*

comprender al paciente que el diente artificial carece de vida y que por esto, nada hay mejor que hacerlo discreto, perfectamente discreto por su color, su tamaño, su forma, su alineamiento: que no llame la atención por grande o pequeño, parejo o no, claro y obscuro. (5).

Decía Miguel Angel que la gran máxima del artista debe ser: “esforzarse mucho por crear algo que no demuestre esfuerzo alguno”. “En arte prostodóntico, la gran máxima es muy similar: esforzarse mucho por crear algo que no llame la atención”. (5).

H.2.- RAZA: Esta influye por las diferencias de color, tanto de la piel como del cabello, ojos, etc. Mientras más oscuras sean estas características, más oscuros deberán escogerse los dientes. (1).

H.3.- EDAD: Los dientes naturales, conforme se avanza en edad, se vuelven más oscuros debido a la formación de dentina secundaria y disminución de la translucidez del diente. Por esta razón, los dientes elegidos para pacientes de edad avanzada, deben ser más oscuros. (1).

H.4.- SEXO: Los dientes de las mujeres son más translúcidos. El color de la piel ojos y cabello del paciente influyen en la misma forma, es decir que mientras más oscuros sean estos factores, el color debe escogerse dentro de los más oscuros de la guía. Las personas rubias, de la piel clara y ojos claros, tendrán dientes mucho más claros que aquellos de pelo negro y piel oscura. (1).

H.5.- LABIOS: *El movimiento de los labios es dinámico, mientras que los dientes antero-superiores son estáticos. Por tanto, la armonía entre ellos es muy importante estéticamente y domina la dignidad de la cara. (2).*

Por ejemplo, el arreglo de la forma de los dientes cuadrados para labios gruesos o la forma ovoide para labios delgados están fuera de armonía con la cara. (5).

L.- DISPOSITIVOS UTILIZADOS POR LOS ARTISTAS: *Las dentaduras artificiales serán más satisfactorias desde el punto de vista de la estética si utilizamos ciertos dispositivos bien conocidos por los artistas. Para lograr una composición armoniosa, los maestros en diversas artes dan importancia a:*

- 1- Puntos de observación*
- 2- Equilibrio*
- 3- Perspectiva*
- 4- Proporción*
- 5- Línea*
- 6- Detalles*
- 7- Textura de la superficie*
- 8- Luz y sombra*
- 9- Color*
- 10- Contraste*
- 11- Masa*
- 12- Alteración*
- 13- Encuadre*

14- Agrupación

15- Norma estética y asimetría. (3).

Los dentistas podrán muy bien proyectar sus montajes de dientes con ayuda de las normas señaladas tratando de lograr un dominio de sus varios detalles. (3).

I.1.- PUNTO DE OBSERVACION: *Si la disposición de los dientes estuviera sujeta a exámen desde lados oclusal, lingual y bucal del mismo modo que lo está desde el labial, el punto de observación presentaría problemas más complejos. Mientras que el escultor y el arquitecto deben considerar un amplio margen de puntos de vista y observación, el dentista debe concentrar sus esfuerzos sobre el aspecto que presentará la disposición de dientes vista desde unos ángulos restringidos, tanto horizontal como vertical, no obstante, es de mucha importancia seleccionar los dientes con el criterio de que éstos pueden verse desde distintos puntos; el dentista debe pensar que esta fase del aspecto de la restauración dental no solo debe ser considerada desde el acostumbrado punto de vista de frente, sino, además, desde uno y otro lado de la boca, desde arriba y desde abajo, con los labios en reposo y en movimiento, al hablar y al sonreír. Todos estos detalles son muy esenciales en cuanto al éxito logrado con los determinados aspectos de la disposición de los dientes. (5).*

I.2.- EQUILIBRIO: *El problema que presenta para el dentista el equilibrio de su composición es muy simple, sin embargo, con su composición estructurada adecuadamente, este factor del equilibrio requiere atención, especialmente cuando*

utilizamos dientes abigarrados y moteados. En una pintura bien equilibrada, el lado derecho y el izquierdo de la composición debe presentar idéntica atracción para el ojo; este efecto se consigue fácilmente cuando hay masas similares en ambos lados; del mismo modo el equilibrio cromático se obtiene utilizando colores similares en ambas mitades. (5).

Con los incisivos centrales colocados en el centro de la cara y con los dientes derechos e izquierdos colocados a pares con tamaños y formas idénticas, no hay realmente problema en cuanto a equilibrio de masas; por otra parte, los fabricantes tratan a su vez de solucionar el problema del equilibrio cromático al proporcionarle los dientes agrupados en juegos o series. Sin embargo, cuando queremos mejorar la naturalidad del aspecto, si seleccionamos distintos tamaños y colores (nosotros lo hacemos), entonces hay peligro de trastornar el equilibrio del conjunto; los dientes del lado derecho, por ejemplo, no deben ser mucho más pequeños que los del lado izquierdo; cuando un diente más oscuro o su equivalente (dos dientes medio oscuros) debe ser colocado en el lado opuesto, a fin de mantener el equilibrio. (5).

1.3.- PERSPECTIVA: La perspectiva lineal es aquella en la cual se crea la ilusión de distancias sobre una superficie plana por medio de líneas; tiene poco interés directo para el dentista. La perspectiva cromática, por el contrario crea la ilusión de distancia por medio del color; por ejemplo, a algunos tonos (tales como el amarillo y el rojo) se les considera "llamativos", ya que tienen más fuerzas atractivas que otros (tales como el verde y el azul); tienen el poder de atracción y de llamar la atención. (3).

La ilusión de distancia se hace más evidente cuando se colocan juntos diversos objetos con diferentes grados de atracción visual; por ejemplo, cuando los dientes anteriores se montan borde a borde, los inferiores parecieran estar más atrás solo por el sencillo procedimiento de elegir los más oscuros; del mismo modo, a un diente que se coloca más prominente que sus vecinos puede suavisársele esta prominencia colocando menos prominente en relación a la arcada. Todos estos factores debemos tenerlos en cuenta durante la selección de los dientes. (3).

I.4.- PROPORCION: *Los dos factores estéticos principales, en cuanto a la proporción de los dientes, son el ancho y la longitud. Para cualquier cara, el ancho adecuado de los dientes se determina muy facilmente y es más importante que la longitud de los mismos. (3).*

J.- ASPECTOS ANTROPOLOGICOS:

ANALISIS DE MODELOS PARA LA SELECCION DEL MOLDE ANTERIOR:

Se recomienda efectuar la selección de los dientes anteriores con el paciente. La forma del arco maxilar puede ser resaltada con lápiz sobre la cresta del reborde alveolar, esto seguirá la forma del molde. Este simple procedimiento proveerá una base anatómica para la selección de la forma de los dientes anteriores cuando no se tiene ninguna otra información disponible. (8).

El largo coronal del incisivo central superior puede ser estimado a través de relaciones anatómicas, midiendo la distancia del centro de la papila incisiva al área de

la foveola palatina y esta distancia dividida entre 4. El largo coronal de los dientes para dentaduras no incluye el área cervical de la raíz de estos, únicamente la porción coronal. El ancho del incisivo central superior se relaciona al ancho total de las seis piezas anteriores. Dos métodos básicos que utilizan relaciones anatómicas pueden ser empleados para calcular el ancho total de los seis dientes antero-superiores en un modelo edéntulo. El ancho de los seis dientes anteriores superiores, puede ser medido y especificado en una de estas dos maneras. No hay norma. Ivoclar mide este ancho plano entendiéndose que esta medida plana es de distal a distal de canino cuando los dientes están sobre una superficie plana. Algunos fabricantes efectúan esta medición de los anteriores en una curva. La diferencia entre los dos (plano y curva) debe ser claramente entendida. Aquí hay un ejemplo: El molde Ivoclar A 27 para anteriores superiores mide 48.5 mm planos como se especifican. Los dientes anteriores son colocados siguiendo la curvatura del arco, cuando esto se hace, los puntos de contacto son angulados para seguir la curvatura. Esta curvatura causa que el ancho de distal de canino a canino aumente en 5 mm. Así el A 27 medirá 53.5 mm en curva. Recuerde el significado de plano o curvo cuando use cualquier método para seleccionar el ancho de un juego para anteriores 1 x 6. (8).

J.1.- METODO NUMERO 1:

- 1- Medida "A" de la punta de ruga más larga a la hendidura hamolar.**
- 2- Medida "B" de la punta de la ruga más larga a la hendidura hamolar.**
- 3- Medida "C" la distancia entre la cresta de ambas tuberosidades.**
- 4- Sume los tres valores y el resultado divídalo entre 3.**

5- El promedio de los tres valores (paso 4) da aproximadamente la medida obtenida en la curva del eje largo de un canino a otro. Por ejemplo: la medida entre el eje largo de un canino al otro no incluye las porciones distales de éstos por lo que se necesita un factor adicional para compensarlo. La compensación se relaciona al ancho de los caninos en 1 x 6 y la siguientes guías deben ser usadas:

- Si el paso No. 4 es menos de 44 mm sume 6
- Si el paso No. 4 es 44-49 mm sume 8
- Si el paso No.4 es 49-54 mm sume 10

He aquí un ejemplo:

$$A=42$$

$$B=46$$

$$C=44$$

$$\text{Total}=132$$

J.2.- METODO NUMERO 2:

- 1- Dibuje una línea en el fondo del surco del área labial.
- 2- Extienda dos líneas de referencia para el eje largo de los caninos de la punta de la ruga más larga horizontalmente a través de la línea trazada en el paso No. 1, ambas áreas caninas.
- 3- Use una regla flexible y mida el largo de línea trazada en el surco, midiendo

desde la línea de referencia del eje largo de un canino al del lado opuesto.

Ahora si la medida es menos de 44 mm, sume 6 ; de 44-49 mm, sume 8 y de 49-54 mm sume 10.

La adición compensará el ancho completo de los caninos y nos dará el ancho recomendado para los seis anteriores en una curva. Para el ancho recomendado de los seis anteriores, medidos en plano, reste 5 mm, por ejemplo:

La línea en el surco labial entre las líneas de referencia para los ejes largos de los caninos mide 46 mm:

$$46 \text{ mm} + 8 \text{ mm} = 54 \text{ mm}$$

54 mm = ancho de los seis anteriores en curva

$$54 \text{ mm} - 5 \text{ mm} = 49 \text{ mm}$$

49 mm = ancho de los seis anteriores en plano

Estudie y practique ambos métodos en varios modelos de pacientes edéntulos para adquirir destreza. (9).

No se ha incluido detalles de longitud cervico-incisal del incisivo lateral, debido a que esta es la pieza del grupo de dientes anteriores superiores, que tiene mayores cambios morfológicos, por ello no es determinante para los fines de éste estudio; y para concluir las referencias antropológicas de las longitudes cervico-incisales de los caninos y los centrales superiores, datos obtenidos de las investigaciones realizadas por el autor Rafel Esponda Vila.

Las dimensiones cervico-incisales en milímetros del incisivo central superior es de un máximo de 12, un mínimo de 8, teniendo como promedio 10. (1).

Las dimensiones cervico-incisales en milímetros de canino superior es de un máximo de 12, un mínimo de 8, teniendo como promedio 10. (1).

III.- MARCO METODOLOGICO:

A. OBJETIVOS:

GENERAL:

Conocer la longitud de arco de los seis dientes anteriores superiores y el largo cervico incisal de los incisivos y caninos superiores en la población de 15 años de edad en adelante, de la cabecera departamental de Quetzaltenango.

ESPECIFICOS:

- 1- Establecer la longitud del arco de los seis dientes anteriores superiores medido de distal de la pieza 6 a distal de la pieza 11.*
- 2- Establecer la longitud cervico-incisal de la corona anatómica de la pieza 8 y la pieza 11.*
- 3- Dejar bases reales en la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala para que sirva para elaborar métodos técnicos con las medidas encontradas en este estudio.*

B.- VARIABLES, DEFINICION E INDICADORES:

VARIABLE INDEPENDIENTE:

LONGITUD

DEFINICION: *Es la mayor de las dimensiones de una superficie, la distancia de un lugar al primer meridiano.*

INDICADOR: *Al referirnos a longitud, se está estableciendo la medida en milímetros del largo del arco de distal de pieza 6 a distal de pieza 11, y la medida cervico-incisal de las piezas 8 y 11.*

VARIABLES DEPENDIENTES:

TAMAÑO DE LOS DIENTES NATURALES

DEFINICION: *Son las dimensiones que se encuentran en los dientes anteriores superiores de un individuo con su dentadura totalmente desarrollada.*

INDICADOR: *Al referirnos al tamaño, se está haciendo mención de las dimensiones que se encuentren en las mediciones de los dientes naturales en estudio.*

EDAD:

DEFINICION: *Es el tiempo de vida expresado en años desde el nacimiento hasta el momento del examen clínico.*

INDICADOR: *Tiempo de vida, expresado en años.*

PRESENCIA DE LOS 6 DIENTES ANTERIORES SUPERIORES:

DEFINICION: *Cuando no falta en el arco superior de un adulto, ninguno de los seis dientes anteriores superiores.*

INDICADOR: *Deben estar en el arco superior los 6 dientes naturales alineados y sin restauraciones ni apariencia de enfermedad periodontal, por lo que se descartaron en dicho estudio, los individuos que no cumplieron con dicho requisito.*

SEXO

DEFINICION: *Condición orgánica que distingue al macho de la hembra en los seres humanos. Es el conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo.*

INDICADOR: *Al referirnos al sexo, se está haciendo mención que se incluyen tanto hombres como mujeres.*

C.- CRITERIOS DE INCLUSION:

El presente estudio se realizó en individuos de 15 años de edad en adelante, de ambos sexos que asisten a la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de Occidente Sección Diurna de la cabecera departamental de Quetzaltenango, que reunieron los requisitos pre establecidos y debidamente detallados en la metodología de esta investigación.

DISEÑO DE INVESTIGACION:

E.- PROCEDIMIENTO

1.- Se eligió la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de Occidente Sección Diurna por ser mixta y la de mayor población estudiantil de la cabecera departamental de Quetzaltenango.

2.- Se hizo el contacto con las autoridades de dicha Escuela: se les informó sobre el estudio y se les solicitó su colaboración para realizarlo.

3.- La muestra fué seleccionada después de un procedimiento de preselección de la población, eligiendo a individuos en edad de 15 años en adelante con una dentadura completa, alineada, sin restauraciones, sin diastemas, sin presencia de caries proximal extensa y sin enfermedad periodontal aparente, con el objeto de evitar alteraciones de datos y resultados en la medición dental.

El universo fué de 750 estudiantes de diversificado de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de Occidente Sección Diurna, de la cabecera departamental de Quetzaltenango de la República de Guatemala, comprendidos en edad de 15 años en adelante, tomándose el 100% de la población que cumplía con los requisitos anteriormente citados, obteniendo así una muestra de 140 estudiantes.

4.- Se prepararon los instrumentos para las mediciones, como lo son:

4.1.- REGLA MILIMETRADA: De una hoja de papel milimetrada, se quemaron los

acetatos necesarios para obtener las reglas milimetradas. Estas reglas se prepararon cortando debidamente con guillotina, una longitud de 85 milímetros.

Antes de ser recortada la regla, se colocó a cada 5 milímetros el número de plastiplay para determinar con exactitud la longitud de la misma.

4.2.- CALIBRADOR DE BOLEY: Se utilizó para el estudio el calibrador de metal indicado para realizar las mediciones.

5.- El examen clínico se realizó en el individuo, objeto de estudio, sentado en una silla, utilizando luz natural, y luego de haber secado los seis dientes anteriores superiores con gaza y aire, se procedió con el espejo intraoral #5 y el explorador, a determinar que no hubiera caries proximal, luego se pasó hilo dental, de igual forma se determinó la inexistencia de restauraciones, ni enfermedad periodontal aparente, y finalmente se determinó que tuviera una dentadura completa y alineada,

Con el examinador de pie, frente al estudiado, se efectuaron las mediciones.

6.- Las mediciones en el examen clínico consistieron en determinar:

- a) El largo cérvico-incisal de la pieza 8, medida del borde incisal a cervical de la corona anatómica en el tercio medio, siguiendo el eje largo de la pieza dental.*
- b) El largo cérvico-incisal de la pieza 11, se midió del borde de la cúspide a cervical de la corona anatómica en el tercio medio, siguiendo el eje largo de la pieza dental.*
- c) La longitud del arco se midió colocando la regla milimetrada en el ángulo de unión*

d) del brazo distal con la cara distal de la pieza 6, a la misma región anatómica de la pieza 11, siguiendo el tercio medio de las piezas dentales y apoyada sobre la cara Labial de las mismas.

Esta medición se hizo con los dedos índice y pulgar colocados en los extremos de la regla.

7.- Con los resultados obtenidos se procedió a la tabulación de datos, los cuales son presentados en tablas, cuadros y gráficas.

MARCO OPERATIVO

A. RECURSOS QUE SE REQUIEREN:

A.1.- HUMANOS:

A.1.1.- La investigadora

A.1.2.- Comisión de tesis y autoridades de la Facultad de

Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

A.1.3.- Asesor.

*A.1.4.- Personal de la Escuela Nacional De Ciencias Comerciales
de Occidente.*

A.1.5.- Alumnos de dicha escuela en edades de 15 años en adelante.

A.2.- MATERIALES:

A.2.1.- Transporte.

A.2.2.- Lapiceros

A.2.3.- Fichas de recolección de datos

A.2.4.- Hojas de papel

A.2.5.- Viaticos en general

A.2.6.- Calibrador de boley

A.2.7.- Regla milimetrada flexible

A.2.8.- Guantes y mascarilla

*A.2.9.- Espejos intraorales #5, pinzas, exploradore, hilo dental y
gaza.*

A.2.10.- Bandeja para instrumentos

A.2.11.- Bandeja para desinfeccion en frio

A.2.12.- Pera de aire

A.2.13.- Computadora

A.3.- ECONOMICOS Y FINANCIEROS:

A.3.1.- Por cuenta de la interesada

A.4.- LOGISTICA:

A.4.1.- Aportada por la investigadora

A.5.- PRESUPUESTO:

A.5.1.- Aportada por la investigadora

B. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS.

TABLA GENERAL DE DATOS

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEDICION CERVICO-INCISAL DE PIEZA No.8, PIEZA No.11 Y DE LA LONGITUD DE ARCO DE DISTAL DE PIEZA No.6 A DISTAL DE PIEZA No.11 EN mm, EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES DE AMBOS SEXOS, DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO DE 1,997

CASO	SEXO	CENTRAL	CANINO	LONGITUD DE ARCO
1	F	10	9	58
2	F	9	9	51
3	F	9.5	9.5	54
4	F	9.5	9	49
5	F	9.5	9	52
6	F	8.5	8.5	49
7	F	8.5	8.5	56
8	F	8	8	58
9	F	8.5	8.5	56
10	F	9	8.5	54
11	M	10	10	49
12	M	8.5	8.5	49
13	M	8.5	8.5	53
14	M	9.5	9	57
15	M	9.5	9.5	57
16	M	10	10	58
17	M	9.5	9	58
18	M	10	10	55
19	M	10	9	49
20	M	9.5	9.5	49
21	M	9	9	54
22	M	9.5	9	49
23	M	9.5	9	49
24	M	8.5	8	49
25	M	8.5	8	54
26	M	9	8.5	54
27	M	9.5	9	53
28	M	9	8.5	55
29	F	8.5	8.5	51
30	F	8.5	8	50
31	F	9	8.5	53
32	F	9	9	57
33	M	10	9	57
34	M	9	8.5	59
35	M	10	8	56
36	M	10	10	59
37	M	10.5	9.5	57
38	M	10	9	54
39	M	9	8.5	58
40	M	10	9.5	57

TABLA GENERAL DE DATOS CONT.

CASO	SEXO	CENTRAL	CANINO	LONGITUD DE ARCO
41	M	10	9.5	57
42	M	9	8.5	52
43	M	8	8.5	49
44	M	9.5	9	63
45	M	11	10	66
46	M	10	9.5	58
47	M	9.5	9	59
48	M	9	8.5	62
49	M	10	10	54
50	M	9	9	57
51	M	10	10	56
52	M	9.5	9.5	54
53	M	9	9	57
54	M	9	8.5	49
55	F	10	9.5	54
56	F	9.5	9	58
57	F	9.5	9	56
58	F	8.5	8.5	58
59	F	10.5	10	52
60	F	8.5	8.5	52
61	F	9	9	52
62	F	8	8.5	50
63	F	9.5	8.5	54
64	F	10	8.5	52
65	F	8.5	9	55
66	F	10	8	55
67	F	8	9	58
68	F	9.5	9.5	58
69	F	10	10.5	57
70	F	10	9	53
71	M	9.5	11	60
72	M	11	9	54
73	M	9	9	52
74	F	9.5	11	56
75	F	11	8.5	47
76	F	8.5	8	57
77	F	8	10	56
78	F	9	8.5	50
79	F	9.5	8.5	55
80	F	7.5	8	56
81	F	8.5	9	57
82	F	9.5	8.5	51
83	M	8.5	9.5	53
84	M	9.5	10	57
85	M	11	11	56
86	M	11	10	54
87	M	9.5	9	53
88	M	8.5	9	54
89	M	9	8.5	53
90	M	8.5	8.5	53

TABLA GENERAL DE DATOS CONT.

CASO	SEXO	CENTRAL	CANINO	LONGITUD DE ARCO
91	M	10.5	10	57
92	M	8.5	8	58
93	M	8.5	8.5	60
94	M	9.5	9	49
95	M	10.5	11	53
96	M	10	9	57
97	M	9	8.5	56
98	M	9	10	57
99	M	11	10	57
100	M	10.5	10	56
101	M	9.5	9.5	60
102	M	8	7.5	56
103	M	9	9	53
104	M	9.5	9.5	56
105	F	9	8.5	47
106	F	8.5	8.5	57
107	F	9.5	8	57
108	F	9	7	52
109	F	10	9.5	56
110	F	9.5	9.5	47
111	F	10	9	55
112	F	9.5	9	58
113	F	10	9	56
114	F	9	8	58
115	F	10	10	50
116	F	10.5	9.5	54
117	F	8	8	52
118	M	9.5	9	49
119	M	10	10	58
120	M	8.5	8	55
121	M	9.5	9.5	59
122	M	8	9	58
123	M	8	8	56
124	M	11	10	52
125	M	10	9	54
126	M	8.5	8.5	54
127	M	10	10	54
128	M	9	9	49
129	M	10	9	53
130	M	9.5	8	52
131	M	10	9	53
132	M	11	9.5	56
133	M	10	10	53
134	M	10	10	56
135	F	9.5	9	53
136	F	9	8.5	60
137	F	9.5	8	55
138	F	10	9.5	58
139	F	9.5	9	52
140	F	10	8.5	53

TABLA No.1

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEDICION CERVICO-INCISAL DE PIEZA No.8 EN MILIMETROS, EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES DE AMBOS SEXOS Y DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO 1,997.

No. DE CASO	mm	No. DE CASO	mm	No. DE CASO	mm	No. DE CASO	mm
1	10	36	10	71	9.5	106	8.5
2	9	37	10.5	72	11	107	9.5
3	9.5	38	10	73	9	108	9
4	9.5	39	9	74	9.5	109	10
5	9.5	40	10	75	11	110	9.5
6	8.5	41	10	76	8.5	111	10
7	8.5	42	9	77	8	112	9.5
8	8	43	8	78	9	113	10
9	8.5	44	9.5	79	9.5	114	9
10	9	45	11	80	7.5	115	10
11	10	46	10	81	8.5	116	10.5
12	8.5	47	9.5	82	9.5	117	8
13	8.5	48	9	83	8.5	118	9.5
14	9.5	49	10	84	9.5	119	10
15	9.5	50	9	85	11	120	8.5
16	10	51	10	86	11	121	9.5
17	9.5	52	9.5	87	9.5	122	8
18	10	53	9	88	9.5	123	8
19	10	54	9	89	9	124	11
20	9.5	55	10	90	8.5	125	10
21	9	56	9.5	91	10.5	126	8.5
22	9.5	57	9.5	92	8.5	127	10
23	9.5	58	8.5	93	8.5	128	9
24	8.5	59	10.5	94	9.5	129	10
25	8.5	60	8.5	95	10.5	130	9.5
26	9	61	9	96	10	131	10
27	9.5	62	8	97	9	132	11
28	9	63	9.5	98	9	133	10
29	8.5	64	10	99	11	134	10
30	8.5	65	8.5	100	10.5	135	9.5
31	9	66	10	101	9.5	136	9
32	9	67	8	102	8	137	9.5
33	10	68	9.5	103	9	138	10
34	9	69	10	104	9.5	139	9.5
35	10	70	10	105	9	140	10

Fuente: Ficha clínica, Quetzaltenango, febrero 1,997


CUADRO No.1

DETERMINACION DE LA MEDIDA CERVICO-INCISAL DE PIEZA No.8, EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES DE AMBOS SEXOS, DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO DE 1,997

LARGO CERVICO INCISAL DE PIEZA No.8 EN mm	NUMERO DE CASOS ENCONTRADOS	PORCENTAJE %
7.5	1	0.71
8	9	6.43
8.5	20	14.29
9	28	20.00
9.5	35	25.00
10	33	23.57
10.5	6	4.28
11	8	5.76
TOTAL	140	100.00

FUENTE: Fichas clínicas Quetzaltenango, febrero 1997

DETERMINACION DE LA MEDIDA CERVICO-INCISAL DE PIEZA No.8, EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES DE AMBOS SEXOS, DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO DE 1,997



FUENTE: Fichas clínicas Quetzaltenango, febrero 1997

A. INTERPRETACION DE LA TABLA No. 1. CUADRO No. 1 Y GRAFICA No. 1:

1.- TABLA No. 1:

En esta tabla se presentan los 140 casos clínicos estudiados de la pieza número 8 es tablecidos en milímetros encontrados en los estudiantes de La Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de Occidente Sección Diurna, de la Cabecera departamental de Quetzaltenango, en edad de 15 años en adelante, sin distinción de sexo.

2.- CUADRO No. 1:

En este cuadro se presenta el número de casos encontrados en el estudio, sin distinción de sexo, con el porcentaje, de las medidas en milímetros encontradas del largo cérvico- incisal de la pieza 8, en el grupo de los 140 casos estudiados. Dicho cuadro nos muestra que en la población estudiada en Quetzaltenango, la longitud más frecuente es 9.5mm, con un porcentaje del 25 %, sin embargo es importante considerar que la diferencia con la longitud de 10 mm es únicamente de 1.43 % y con 9 mm 5 % por lo que se puede concluir que el rango en el cual se encuentra la medida cérvico incisal de la pieza No. 8 está entre 9 y 10 mm. Ya que la diferencia de porcentajes es poco significativa.

3.- GRAFICA No. 1:

En esta gráfica podemos observar que el 68.57 % de los casos encontrados del largo cervico-incisal de pieza No. 8 está distribuido entre 9 y 10 mm.

TABLA No.2

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MEDICION CERVICO-INCISAL DE PIEZA No.11 EN MILIMETROS, EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES DE AMBOS SEXOS Y DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO 1,997.

No. DE CASO	mm	No. DE CASO	mm	No. DE CASO	mm	No. DE CASO	mm
1	9	36	10	71	11	106	8.5
2	9	37	9.5	72	9	107	8
3	9.5	38	9	73	9	108	7
4	9	39	8.5	74	11	109	9.5
5	9	40	9.5	75	8.5	110	9.5
6	8.5	41	9.5	76	8	111	9
7	8.5	42	8.5	77	10	112	9
8	8	43	8.5	78	8.5	113	9
9	8.5	44	9	79	8.5	114	8
10	8.5	45	10	80	8	115	10
11	10	46	9.5	81	9	116	9.5
12	8.5	47	9	82	8.5	117	8
13	8.5	48	8.5	83	9.5	118	9
14	9	49	10	84	10	119	10
15	9.5	50	9	85	11	120	8
16	10	51	10	86	10	121	9.5
17	9	52	9.5	87	9	122	9
18	10	53	9	88	9	123	8
19	9	54	8.5	89	8.5	124	10
20	9.5	55	9.5	90	8.5	125	9
21	9	56	9	91	10	126	8.5
22	9	57	9	92	8	127	10
23	9	58	8.5	93	8.5	128	9
24	8	59	10	94	9	129	9
25	8	60	8.5	95	11	130	8
26	8.5	61	9	96	9	131	9
27	9	62	8.5	97	8.5	132	9.5
28	8.5	63	8.5	98	10	133	10
29	8.5	64	8.5	99	10	134	10
30	8	65	9	100	10	135	9
31	8.5	66	8	101	9.5	136	8.5
32	9	67	9	102	7.5	137	8
33	9	68	9.5	103	9	138	9.5
34	8.5	69	10.5	104	9.5	139	9
35	8	70	9	105	8.5	140	8.5

Fuente: Ficha clínica, Quetzaltenango, febrero 1,997

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central


CUADRO No.2

DETERMINACION DE LA MEDIDA CERVICO-INCISAL DE PIEZA No.11, EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES DE AMBOS SEXOS, DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO DE 1997

LARGO CERVICO INCISAL DE PIEZA No.11 EN mm	NUMERO DE CASOS ENCONTRADOS	PORCENTAJE %
7	1	0.71
7.5	1	0.71
8	16	11.43
8.5	34	24.29
9	43	30.71
9.5	19	13.57
10	21	15.00
10.5	1	0.71
11	4	2.86
TOTAL	140	100.00

FUENTE: Fichas clínicas Quetzaltenango, febrero 1997

DETERMINACION DE LA MEDIDA CERVICO-INCISAL DE PIEZA No.11, EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES DE AMBOS SEXOS, DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO DE 1997



FUENTE: Fichas clínicas Quetzaltenango, febrero 1997

B.- INTERPRETACION DE LA TABLA No.2, CUADRO No.2 Y GRAFICA No. 2:

1.- TABLA No. 2:

En esta tabla se presentan los 140 casos clínicos estudiados de la pieza 11 establecidos en milímetros, encontrados en los estudiantes de La Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de Occidente Sección Diurna, de la cabecera departamental de Quetzaltenango, en edad de 15 años en adelante, sin distinción de sexo.

CUADRO No. 2:

En este cuadro se presenta el número de casos encontrados en el estudio, sin distinción de sexo, con las medidas en milímetros encontradas del largo cérvico-incisal de la pieza 11, en el grupo de los 140 casos estudiados. Dicho cuadro nos muestra, que en la población estudiada de Quetzaltenango, la longitud cérvico-incisal más frecuente de la pieza 11 es de 9 mm con un porcentaje de 30.71 % lo cual representa una tercera parte de la población, en segundo lugar se encontró la longitud de 8.5 mm con un 24.29 %. Por lo que al observar este cuadro podemos concluir que la longitud cérvico-incisal de la pieza No. 11 de esta población se encuentra distribuida en más de un 50 % entre las medidas de 8.5 y 9 mm.

GRAFICA No. 2:

En esta gráfica se puede observar que el 55 % de los casos encontrados del largo cervico-incisal de pieza 11 se encuentran distribuidos entre 8.5 y 9 mm.

TABLA No.3

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MEDICION DE LA LONGITUD DE ARCO DE DISTAL DE PIEZA No. 6 A DISTAL DE PIEZA No.11 EN MILIMETROS, EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES DE AMBOS SEXOS Y DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO 1,997.

No. DE CASO	mm						
1	58	36	59	71	60	106	57
2	51	37	67	72	54	107	57
3	54	38	54	73	52	108	52
4	49	39	58	74	53	109	56
5	52	40	67	75	47	110	47
6	49	41	57	76	57	111	55
7	56	42	52	77	55	112	58
8	58	43	49	78	50	113	56
9	56	44	63	79	55	114	58
10	54	45	56	80	56	115	50
11	49	46	58	81	57	116	54
12	49	47	59	82	51	117	62
13	53	48	62	83	53	118	49
14	57	49	54	84	57	119	58
15	57	50	57	85	56	120	65
16	58	51	56	86	54	121	59
17	58	52	54	87	53	122	58
18	55	53	57	88	54	123	56
19	49	54	49	89	53	124	52
20	49	55	54	90	53	125	54
21	54	56	58	91	57	126	54
22	49	57	56	92	58	127	54
23	49	58	58	93	60	128	49
24	49	59	52	94	49	129	53
25	54	60	52	95	63	130	52
26	54	61	52	96	57	131	53
27	53	62	50	97	56	132	56
28	55	63	54	98	57	133	53
29	51	64	52	99	57	134	56
30	50	65	55	100	56	135	53
31	53	66	65	101	60	136	50
32	57	67	58	102	56	137	55
33	57	68	58	103	53	138	58
34	59	69	57	104	56	139	52
35	56	70	53	105	47	140	53

Fuente: Ficha clínica, Quetzaltenango, febrero 1,997


CUADRO No.3

DETERMINACION DE LA MEDIDA DE LA LONGITUD DE ARCO DE DISTAL DE PIEZA No. 6 A DISTAL DE PIEZA No. 11 EN MM, EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES DE AMBOS SEXOS, DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO DE 1,997

LONGITUD DE ARCO DE DISTAL DE P6 A DISTAL DE P11 EN mm	NUMERO DE CASOS ENCONTRADOS	PORCENTAJE %
47	3	2.14
48	0	0.00
49	14	10.00
50	5	3.57
51	3	2.14
52	11	7.86
53	17	12.14
54	17	12.14
55	9	6.43
56	17	12.14
57	19	13.57
58	16	11.43
59	4	2.86
60	3	2.14
61	0	0.00
62	1	0.71
63	1	0.71
TOTAL	140	100.00

FUENTE: Fichas clínicas Quetzaltenango, febrero 1997

GRAFICA No.3



C.- INTERPRETACION DE LA TABLA No. 3, CUADRO No. 3 Y GRAFICA No. 3:

1.- TABLA No. 3:

En esta tabla se presentan los 140 casos clínicos estudiados de la longitud de arco de distal de pieza 6 a distal de pieza 11, establecidos en milímetros, encontrados en los estudiantes de La Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de Occidente Sección Diurna, de la cabecera departamental de Quetzaltenango, en edad de 15 años en adelante, sin distinción de sexo.

2.- CUADRO No. 3:

En este cuadro se presenta el número de casos encontrados en el estudio, sin distinción de sexo, con el porcentaje de las medidas en milímetros encontrados en la longitud de arco de distal de pieza 6 a distal de pieza 11, en el grupo de los 140 casos estudiados. Dicho cuadro nos muestra, que la longitud de arco más frecuente es de 57 mm con el 13.57 %, sin embargo es importante considerar que el 91.42 % de la población estudiada se encuentra distribuida entre las longitudes de 49 mm a 58 mm ya que no se encuentra una diferencia significativa entre cada una de ellas.

3.- GRAFICA No. 3:

Los mayores porcentajes encontrados en esta gráfica, son los correspondientes a : 53, 54 y 56 mm. con un 12.14 % cada uno de ellos y 57 mm. con un 13.57 %, los cuales no son representativos en la población estudiada.

TABLA No. 4

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MEDICION CERVICO INSISAL DE PIEZA No. 8 EN mm, EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES, DIVIDIDOS POR SEXO Y DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTÉ, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA, DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO, 1997.

CASO	SEXO	CENTRAL	CASO	SEXO	CENTRAL
1	F	10	1	M	10
2	F	9	2	M	8.5
3	F	9.5	3	M	8.5
4	F	9.5	4	M	9.5
5	F	9.5	5	M	9.5
6	F	8.8	6	M	10
7	F	8.5	7	M	9.5
8	F	8	8	M	10
9	F	8.5	9	M	10
10	F	9	10	M	9.5
11	F	8.5	11	M	9
12	F	8.5	12	M	9.5
13	F	9	13	M	9.5
14	F	9	14	M	8.5
15	F	10	15	M	8.5
16	F	9.5	16	M	9
17	F	9.5	17	M	9.5
18	F	8.5	18	M	9
19	F	10.5	19	M	10
20	F	8.5	20	M	9
21	F	9	21	M	10
22	F	8	22	M	10
23	F	10	23	M	10.5
24	F	8.5	24	M	10
25	F	10	25	M	9
26	F	8	26	M	10
27	F	9.5	27	M	10
28	F	10	28	M	9
29	F	10	29	M	8
30	F	9.5	30	M	9.5
31	F	11	31	M	11
32	F	8.5	32	M	10
33	F	8	33	M	9.5
34	F	9	34	M	9
35	F	9.5	35	M	10

CASO	SEXO	CENTRAL	CASO	SEXO	CENTRAL
36	F	7.5	36	M	9
37	F	8.5	37	M	10
38	F	9.5	38	M	9.5
39	F	8.5	39	M	9
40	F	9	40	M	9
41	F	8.5	41	M	11
42	F	9.5	42	M	9
43	F	9	43	M	9.5
44	F	10	44	M	9.5
45	F	9.5	45	M	11
46	F	10	46	M	11
47	F	9.5	47	M	9.5
48	F	10	48	M	9.5
49	F	9	49	M	9
50	F	10	50	M	9
51	F	10.5	51	M	8.5
52	F	8	52	M	10.5
53	F	9.5	53	M	8.5
54	F	9	54	M	8.5
55	F	9.5	55	M	9.5
56	F	10	56	M	10.5
57	F	9.5	57	M	10
58	F	10	58	M	9
			59	M	9
			60	M	11
			61	M	10.5
			62	M	9.5
			63	M	8
			64	M	9
			65	M	9.5
			66	M	9.5
			67	M	10
			68	M	8.5
			69	M	9.5
			70	M	8
			71	M	8
			72	M	11
			73	M	10
			74	M	8.5
			75	M	10
			76	M	9
			77	M	10
			78	M	9.5
			79	M	10
			80	M	11
			81	M	10
			82	M	10

CUADRO No.4


DETERMINACION DE LA MEDIDA CERVICO-INCISAL DE PIEZA No. 8 EN MM, POR SEXO EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES DE AMBOS SEXOS, DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO DE 1,997

LARGO CERVICO INCISAL DE PIEZA No.8 EN mm	SEXO MASCULINO		SEXO FEMENINO	
	CASOS	%	CASOS	%
7.5	0	0.00	1	1.72
8	4	4.88	5	8.62
8.5	9	10.98	12	20.69
9	17	20.73	10	17.24
9.5	20	24.39	15	25.86
10	21	25.61	12	20.69
10.5	4	4.88	2	3.45
11	7	8.54	1	1.72
TOTAL	82	100.00	58	100.00

FUENTE: Fichas clínicas Quetzaltenango, febrero 1997

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Centi

DETERMINACION DE LA MEDIDA CERVICO-INCISAL DE PIEZA No. 8 EN MM, POR SEXO EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES DE AMBOS SEXOS, DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO DE 1,997



FUENTE: Fichas clínicas Quetzaltenango, febrero 1997

D.- INTERPRETACION DEL TABLA No. 4 , CUADRO No. 4 Y GRAFICA No. 4:

1. TABLA No. 4:

En esta tabla se presentan los 82 casos clínicos encontrados del sexo masculino y 58 casos del sexo femenino ambos del largo cervico-incisal de la pieza No. 8 y sus medidas establecidas en mm.

2. CUADRO No. 4 :

En este cuadro se presenta el número de casos encontrados en el estudio, dividido por sexo, con el porcentaje de las medidas encontradas del largo cérvico-incisal de la pieza 8, en el grupo de los 140 casos estudiados, de los cuales 82 son hombres y 58 son mujeres. El cuadro muestra que en la población estudiada en Quetzaltenango, en el sexo masculino la longitud cérvico-incisal más frecuente es de 10 mm con un 25.61 % sin embargo se observa que la diferencia con la longitud de 9.5 mm es únicamente de 1.22 % por lo que se puede concluir que el rango en el cual se encuentra la medida cervico incisal de la pieza No.8 esta entre 9.5 y 10 mm . En el sexo femenino la longitud más frecuente es de 9.5 mm con 25.86 %, sin embargo se observa que la diferencia con la longitud de 8.5 y 10 mm es de 5.17 %. Por lo que se puede concluir que el rango en el cual se encuentra la medida cérvico-incisal esta entre 8.5 y 10mm.

En relación a la importancia del sexo podemos concluir que no la tiene únicamente en el rango de 9 a 10 mm ya que no hay diferencia significativa entre las medidas de ambos sexos.

3.- GRAFICA No. 4:

En esta gráfica se distingue que el 81.68% de la población estudiada en el sexo masculino el largo cervico incisal de pieza No. 8 se encuentra de 9 a 10 mm, en el sexo femenino el 84.48% de la población estudiada se encuentra de 8.5 y 10mm.

TABLA No. 5

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MEDICION CERVICO INSISAL DE PIEZA No. 11 EN mm, EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES, DIVIDIDOS POR SEXO Y DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA, DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO, 1997.

CASO	SEXO	CANINO	CASO	SEXO	CANINO
1	F	9	1	M	10
2	F	9	2	M	8.5
3	F	9.5	3	M	8.5
4	F	9	4	M	9
5	F	9	5	M	9.5
6	F	8.5	6	M	10
7	F	8.5	7	M	9
8	F	8	8	M	10
9	F	8.5	9	M	9
10	F	8.6	10	M	9.5
11	F	8.5	11	M	9
12	F	8	12	M	9
13	F	8.5	13	M	9
14	F	9	14	M	8
15	F	9.5	15	M	8
16	F	9	16	M	8.5
17	F	9	17	M	9
18	F	8.5	18	M	8.5
19	F	10	19	M	9
20	F	8.5	20	M	8.5
21	F	9	21	M	8
22	F	8.5	22	M	10
23	F	8.5	23	M	9.5
24	F	8.5	24	M	9
25	F	9	25	M	8.5
26	F	8	26	M	9.5
27	F	9	27	M	9.5
28	F	9.5	28	M	8.5
29	F	10.5	29	M	8.5
30	F	9	30	M	9
31	F	11	31	M	10
32	F	8.5	32	M	9.5
33	F	8	33	M	9
34	F	10	34	M	8.5
35	F	8.5	35	M	10

CASO	SEXO	CANINO	CASO	SEXO
36	F	8.5	36	M
37	F	8	37	M
38	F	9	38	M
39	F	8.5	39	M
40	F	8.5	40	M
41	F	8.5	41	M
42	F	8	42	M
43	F	7	43	M
44	F	9.5	44	M
45	F	9.5	45	M
46	F	9	46	M
47	F	9	47	M
48	F	9	48	M
49	F	8	49	M
50	F	10	50	M
51	F	9.5	51	M
52	F	8	52	M
53	F	9	53	M
54	F	8.5	54	M
55	F	8	55	M
56	F	9.5	56	M
57	F	9	57	M
58	F	8.5	58	M
			59	M
			60	M
			61	M
			62	M
			63	M
			64	M
			65	M
			66	M
			67	M
			68	M
			69	M
			70	M
			71	M
			72	M
			73	M
			74	M
			75	M
			76	M
			77	M
			78	M
			79	M
			80	M
			81	M
			82	M

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central


CUADRO No.5

DETERMINACION DE LA MEDIDA CERVICO-INCISAL DE PIEZA No. 11 EN mm, POR SEXO EN UNA POBLACION DE 140 ESTUDIANTES DE AMBOS SEXOS, DE 15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO DE 1,997

LARGO CERVICO INCISAL DE PIEZA No.11 EN mm	SEXO MASCULINO		SEXO FEMENINO	
	CASOS	%	CASOS	%
7	0	0.00	1	1.72
7.5	1	1.22	0	0.00
8	7	8.54	9	15.52
8.5	15	18.29	19	32.76
9	26	31.71	17	29.31
9.5	12	14.63	7	12.07
10	18	21.95	3	5.17
10.5	0	0.00	1	1.72
11	3	3.66	1	1.72
TOTAL	82	100.00	58	100.00

FUENTE: Fichas clínicas Quetzaltenango, febrero 1997

GRAFICA No.5



E.- INTERPRETACION DE LA TABLA No.5, CUADRO No. 5 Y DE LA GRAFICA

No. 5:

1.- TABLA No. 5:

En esta tabla se presentan los 82 casos clínicos encontrados del sexo masculino y los 58 casos del sexo femenino, ambos del largo cervico incisal de la pieza No. 11 y sus medidas establecidas en milímetros.

2.- CUADRO No. 5:

En este cuadro y gráfica se presentan el número de casos encontrados en el estudio, por sexo, con el porcentaje, de los casos encontrados del largo cérvico-incisal de la pieza 11 en el grupo de los 140 casos estudiados, de los cuales el 82 son hombres y 58 mujeres. Dicho cuadro nos muestra que la longitud más frecuente en el sexo masculino es de 9 mm. con un 31.71 %, mientras que en el sexo femenino es de 32.76 % en 8.5 mm., observándose una diferencia de 3.45 % con la de 9 mm., por lo que se concluye que la diferencia entre el sexo masculino y femenino es de 1.05 % entre las medidas de 9 mm. en masculino y 8.5 mm. en femenino encontrándose que no hay diferencia significativa.

3.- GRAFICA No. 5:

En esta gráfica se se observa que el 86.58% de la muestra del sexo masculino del largo cervico incisal de la pieza No. 11 está distribuida entre 8.5 mm 10 mm; en el sexo femenino el 89.66% de la muestra del largo cervico-incisal se encuentra entre 8 y 9.5 mm.

TABLA No. 6

**RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MEDICION DE LA LONGITUD DE ARCO DE
DISTAL DE PIEZA No.6 A DISTAL DE PIEZA No. 11 EN MM; EN UNA
POBLACION DE 140 ESTUDIANTES, DIVIDIDOS POR SEXO Y DE 15 AÑOS DE
EDAD EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS
COMERCIALES DE OCCIDENTE SECCION DIURNA, DE LA CABECERA
DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO, 1997**

CASO	SEXO	LONGITUD DE ARCO	CASO	SEXO	LONGITUD DE ARCO
1	F	58	1	M	54
2	F	51	2	M	49
3	F	54	3	M	49
4	F	49	4	M	53
5	F	52	5	M	57
6	F	49	6	M	57
7	F	56	7	M	58
8	F	58	8	M	58
9	F	56	9	M	56
10	F	53	10	M	49
11	F	55	11	M	49
12	F	51	12	M	54
13	F	50	13	M	49
14	F	53	14	M	49
15	F	49	15	M	49
16	F	54	16	M	54
17	F	58	17	M	54
18	F	56	18	M	53
19	F	58	19	M	57
20	F	52	20	M	57
21	F	52	21	M	59
22	F	50	22	M	56
23	F	54	23	M	59
24	F	52	24	M	57
25	F	55	25	M	54
26	F	55	26	M	58
27	F	68	27	M	57
28	F	58	28	M	57
29	F	57	29	M	52
30	F	53	30	M	49
31	F	53	31	M	63
32	F	47	32	M	56
33	F	57	33	M	58
34	F	55	34	M	59
35	F	50	35	M	62

CASO	SEXO	LONGITUD DE ARCO	CASO	SEXO	LONGITUD DE ARCO
36	F	55	36	M	54
37	F	56	37	M	57
38	F	57	38	M	56
39	F	51	39	M	54
40	F	47	40	M	57
41	F	57	41	M	60
42	F	57	42	M	54
43	F	52	43	M	52
44	F	56	44	M	53
45	F	47	45	M	57
46	F	55	46	M	56
47	F	58	47	M	54
48	F	56	48	M	53
49	F	58	49	M	54
50	F	50	50	M	53
51	F	54	51	M	53
52	F	52	52	M	57
53	F	53	53	M	58
54	F	50	54	M	60
55	F	55	55	M	49
56	F	58	56	M	53
57	F	52	57	M	57
58	F	53	58	M	56
			59	M	57
			60	M	57
			61	M	56
			62	M	60
			63	M	56
			64	M	53
			65	M	56
			66	M	49
			67	M	58
			68	M	55
			69	M	59
			70	M	58
			71	M	56
			72	M	52
			73	M	54
			74	M	54
			75	M	54
			76	M	49
			77	M	53
			78	M	52
			79	M	53
			80	M	56
			81	M	53
			82	M	56


CUADRO No.6

**DETERMINACION DE LA MEDIDA DE LONGITUD DE ARCO DE DISTAL DE
PIEZA No. 6 A DISTAL DE PIEZA No. 11 EN mm, POR SEXO EN UNA
POBLACION DE 140 ESTUDIANTES DE AMBOS SEXOS, DE 15 AÑOS DE EDAD
EN ADELANTE, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES
DE OCCIDENTE SECCION DIURNA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE
QUETZALTENANGO, GUATEMALA, FEBRERO DE 1,997**

LONGITUD DE ARCO DE DISTAL DE P6 A DISTAL DE P11 EN mm	SEXO MASCULINO		SEXO FEMENINO	
	CASOS	%	CASOS	%
47	0	0.00	3	5.17
48	0	0.00	0	0.00
49	11	13.41	3	5.17
50	0	0.00	5	8.62
51	0	0.00	3	5.17
52	4	4.87	7	12.06
53	11	13.41	6	10.34
54	13	15.85	4	6.89
55	2	2.43	7	12.06
56	11	13.41	6	10.34
57	14	17.07	5	8.62
58	7	8.53	9	15.51
59	4	4.87	0	0.00
60	3	3.65	0	0.00
61	0	0.00	0	0.00
62	1	1.21	0	0.00
63	1	1.21	0	0.00
TOTAL	82	100	58	100

FUENTE: Fichas clínicas Quetzaltenango, febrero 1997

GRAFICA No. 6



F.- INTERPRETACION DE LA TABLA No.6 CUADRO Y GRAFICA No. 6:

1.- TABLA 6:

En esta tabla se presentan los 82 casos clínicos encontrados en el sexo masculino y los 58 casos del sexo femenino, ambos de la longitud de arco de distal de pieza No.6 a distal de pieza No.11, y sus medidas establecidas en mm.

2.- CUADRO No. 6 :

En este cuadro se presenta el número de casos encontrados en el estudio, por sexo, con el porcentaje, de los casos encontrados de la longitud de arco de distal de pieza 6 a distal de pieza 11 en el grupo de los 140 casos estudiados, de los cuales 82 son hombres y 58 mujeres. Dicho cuadro nos muestran que en la población estudiada en Quetzaltenango en el sexo masculino la longitud de arco de distal de pieza No. 6 a distal de pieza No. 11 más frecuente es de 57 mm. con un 17.07 %, sin embargo su diferencia en porcentaje con la longitud de 54 mm. es de 1.22 % no siendo significativo ya que las longitudes de la población de este sexo está distribuida desde 49 a 60 mm., mientras que en el sexo femenino la longitud de arco más frecuente es de 58 mm. con un 15.51 %, con el resto de la población distribuida desde 47 a 58 mm.. Se concluye que la longitud de arco en la población estudiada es similar en ambos sexos, ya que en los dos se encuentra distribuida y con longitudes no significativas.

3.- GRAFICA No.6:

En ésta gráfica se puede observar que la longitud de arco de distal de pieza No. 6 a distal de pieza No. 11 el 97.58% de los casos en el sexo masculino se encontró distribuido entre 49 y 60 mm., en el sexo femenino se encontró que el total de los casos están distribuidos entre 47 y 58 mm.

C.- CONCLUSIONES:

- 1.- En la población estudiada, el largo cérvico-incisal de la pieza 8 más frecuente varía de 9.5 a 10 mm., para ambos sexos, con porcentajes de 25 y 23.57% respectivamente.**
- 2.- El largo cérvico-incisal de la pieza 11, en la población estudiada y en ambos sexos, más frecuente es de 9 mm. con porcentaje de 30.71%.**
- 3.- La longitud de arco de distal de pieza 6 a distal de pieza 11, en la muestra analizada, más frecuente fluctúa entre 49 mm. con 10%, a 53, 54, 56 mm. con 12.14%, 57 mm. con 13.67% y 58 mm. con 11.43%. No se encontraron longitudes de arco de 46 mm.**
- 4.- En la población estudiada la longitud cérvico-incisal de la pieza 8, es independiente del sexo del individuo.**
- 5.- El largo cérvico-incisal de la pieza 11 no varía de gran manera de acuerdo con el sexo del individuo, ya que para el sexo masculino las medidas más frecuentes son de 9 mm y 10 mm., mientras que para el sexo femenino, las dimensiones se encuentran entre 8.5 mm y 9 mm.**

6.- La longitud de arco varía en relación al sexo del individuo analizado, ya que para el sexo femenino se presentan longitudes que van de 47 a 58 mm., con frecuencias más altas para la longitud de arco de distal de pieza 6 a distal de pieza 11 de 58 mm., para el sexo masculino dicha longitud varía de 49, 53, 54, 56 a 58 mm., presentándose con mayor frecuencia longitudes de 57 mm.

7.- El largo cérvico-incisal de la pieza 11 tiende a ser más pequeño que el de la pieza

8. El 67% de la pieza 11 tiende a ser igual o menor a 9 mm; el 41% de la pieza 8 es igual o menor a 9mm.

8.- Para la población considerada en este estudio, y con base en los resultados obtenidos se establece que no se cumple con la premisa que asevera que el tamaño de la pieza 11 es similar al de la pieza 8.

D.- RECOMENDACIONES

1.- Se recomienda al área de Odontología Restaurativa de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tomar en consideración el presente estudio para hacer las solicitudes al almacén de la facultad y al departamento de compras, y por medio de estas solicitudes a los depósitos dentales, el surtido del tamaño de los dientes artificiales para prótesis, con base en las medidas encontradas durante esta investigación.

2.- Es necesario realizar estudios de este tipo en otras regiones del país y para cada uno de los grupos étnicos, para establecer una dimensión dentaria promedio que sea más aproximada a las características de nuestra población.

3.- Se considera conveniente profundizar en este tipo de investigaciones para establecer la validez de ciertos principios odontológicos, tal el caso del principio que señala que el tamaño de la pieza 8 va a ser similar al de la pieza 11, ya que por los resultados alcanzados durante el presente estudio, se hace necesario replantear este principio.

4. En la medida de lo posible, las investigaciones que se generen con base en la metodología propuesta en este estudio, se empleen los mismos instrumentos y técnicas para mantener una uniformidad en los resultados que se obtengan.

E.- LIMITACION:

Una de las limitaciones que se encontraron en la realización del presente estudio, fue la falta de comodidad tanto para el estudiado como para el investigador, siendo realizado en ausencia de un sillón dental y luz artificial.

ANEXO I

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA**

FICHA No:

**"LARGO CERVICO INCISAL DE LAS PIEZAS 8 Y 11, Y LONGITUD DE ARCO DE LOS
DIENTES ANTERIORES SUPERIORES"**

DATOS GENERALES:

FECHA DE EXAMEN:

DEPARTAMENTO:

INSTITUTO:

EXAMINADOR:

NOMBRE DEL EXAMINADO:

EDAD:

SEXO:

LONGITUDES DENTALES:

LARGO CERVICI INCISAL DE PIEZA No. 8: mm

LARGO CERVICI INCISAL DE PIEZA No.11: mm

LONG. DE ARCO DE DISTAL DE PIEZA No. 6 A DISTAL DE PIEZA No. mm

ANEXO II

“INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA FICHA DE RECOLECCION DE DATOS”

FICHA No: *Se anotó en numeros arábigos, el número correspondiente en orden correlativo.*

DATOS GENERALES:

FECHA DE EXAMEN: *Se anotó el día que se realizó el exámen clínico, en números arábigos.*

DEPARTAMENTO: *Se anotó el nombre del departamento y su cabecera en la cual se realizó el estudio.*

INSTITUTO: *Se anotó el nombre del establecimiento de educación media en donde realiza sus estudios el examinado.*

EXAMINADOR: *Se anotó el nombre de la persona que realiza el estudio en cuestión.*

NOMBRE DEL EXAMINADO: *Se anotó el nombre de la persona objeto de estudio.*

EDAD: *Se anotó en números arábigos la edad del paciente en años cumplidos.*

SEXO: *Se anotó el sexo del paciente, colocando una letra “F” para femenino y una letra “M” para masculino.*

LONGITUDES DENTALES:

LONGITUD CERVICO-INCISAL DE PIEZA 8: *Se anotó en números arábigos, la medida en milímetros que nos dió al realizar esta medición con el calibrador de Boley.*

LONGITUD CERVICO-INCISAL DE PIEZA 11: *Se anotó en números arábigos, la medida en milímetros que nos dió al realizar esta medición con el calibrador de Boley.*

LONGITUD DE ARCO DE DISTAL DE PIEZA 6 A DISTAL DE PIEZA 11: *Se anotó en números arábigos, la medida en milímetros que nos dió la regla milimetrada, al realizar esta medición.*

BIBLIOGRAFIA

- 1.- **Esponda Vila, R.** Anatomía dental. 2a. ed. México, Manuales Universitarios, 1970. p.p. 95-159.
- 2.- **Guatemala. Universidad de San Carlos. Facultad de Odontología.** Area de Prótesis Total. Selección de dientes artificiales; anteriores y posteriores. Guatemala, 1986. p.p. 1-11.
- 3.- **Kawabe, S.** Dentaduras totales. Traducido por Hideo Aoki. Caracas, Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica, 1993. p.p. 87-105.
- 4.- **Lang Brien, Kelsey Charles.** Complete denture occlusion. 2a. ed. The University of Michigan, 1976. p.p. 122.
- 5.- **Leland Le Gro, A.** Protesis dental en porcelana. Traducido por Dr. J. Vila y Torrent. 2a. ed. Madrid, Labor, 1934. p.p. 106-119.
- 6.- **R.J. Nagle, V.H. Sears, y S.I. Silverman.** Prótesis total; dentaduras completas. Traducido por Mariano Sanz Martín. 2a. ed. Barcelona, Toray, 1965. p.p. 314-323.
- 7.- **Ripol, C.** Prostodoncia conceptos generales. México, Mercadotécnica Odontológica, 1976. 625p.
- 8.- **Saizar, P.** Prostodoncia total. Buenos Aires, Mundi, 1972. p.p. 329-338.
- 9.- **Shillinburg, H.** Fundamentos de prostodoncia fija. Traducido por Rodolfo Krenn. 3a. ed. México, La prensa Médica Mejicana, 1978. 333 p.
- 10.- **Swenson, M.G.** Coplete dentures. 3a. ed. Saint louis, Mosby, 1953. 336 p.
- 11.- **Tylman, S.D.** Theory and practice of complete denture. 3a. ed. Saint louis, Mosby, 1954. 636 p.
- 12.- **Zarb, G.A., B. Bergman, J.A. Clayton and H.F. Makay.** Prosthodontic treatment for partialli edentulous. Saint louis, Mosby, 1978. p.p. 298-299.

Vo. Bo.

Dr. E. E. E.
17-3-87



Maria del Carmen Pacheco Castañeda
**MARIA DEL CARMEN
PACHECO CASTAÑEDA**

Jorge Luis Villatoro Lopez
**Dr. JORGE LUIS VILLATORO LOPEZ
ASESOR**

Jose Guillermo Ordonez
**Dr. JOSE GUILLERMO ORDÓÑEZ
COMISION DE TESIS**

Guillermo Rosales Escriba
**Dr. GUILLERMO ROSALES ESCRIBA
COMISION DE TESIS**

Carlos Alvarado Cerezo
**Dr. CARLOS ALVARADO CEREZO
SECRETARIO GENERAL**

